PROTOCOLO DE PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR

ÁREA INTEGRADA
DE TALAVERA DE LA REINA
Versión: 28.10.2022

ÁREA INTEGRADA
Talavera de la Reina

Castilla-La Mancha

AUTORES

- **Fernández Crespo, Susana:** Subdirectora Enfermería GAI Talavera
- **García Durán, Sandra:** Coordinadora de Fisioterapia de Atención Primaria
- **Gil Granados, Ana Carmen:** Coordinadora Centro de Salud Río Tajo. Médico especialista en MFYC
- **González Polo, Francisco Javier:** Coordinador de Reumatología. FEA Reumatología
- **Hernando Mayor, Ana M^a:** Jefa de Servicio de Rehabilitación. FEA Medicina Física y Rehabilitación
- **Labrador García, M^a Salobrar:** Coordinadora en funciones Centro de Salud Algodonera. Médico especialista en MFYC
- **Loarte Pérez, Isabel:** Responsable de Fisioterapia hospitalaria
- **López Arteaga, M^a Teresa:** Directora Médico GAI Talavera
- **Magaña Loarte, José Enrique:** Coordinador Centro de Salud La Estación. Médico especialista en MFYC
- **Merino Segovia, Rocío:** Subdirectora Médico GAI Talavera
- **Montes Vergara, Carlos:** Jefe de Sección de Cirugía Ortopédica y Traumatología. FEA Traumatología
- **Ortiz Muñoz, Elena:** Jefa de Servicio de Urgencias. Médico especialista en MFYC
- **Rodríguez Pinto, Yoselvi Alexandra:** Coordinadora de Unidad de Dolor del SART. FEA Anestesia y Reanimación.
- **Santamaría Rodríguez, Teresa:** Coordinadora Centro de Salud Talavera Centro. Médico especialista en MFYC

OBJETIVOS

- Conocer la **cartera de servicios** del área
- Adquirir máximo **techo competencial** (de todas las categorías profesionales)
- **Derivar** de forma **eficiente**
- **Evitar yatrogenia**
- **Intentar resolver** (en la medida de lo posible) las demandas de los pacientes con el menor número de actos clínicos

ESCALA DE INTERVENCIÓN

ESCALA DE TRATAMIENTO

PASO 1: TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

- Ejercicio
- terapia física
- higiene del sueño
- terapia conductual (modificación de malos hábitos)
- control dietético

Control por **Enfermería y Fisioterapia de Atención Primaria**

PASO 2: TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON ANALGÉSICOS

•Control por **Enfermería y Fisioterapia de Atención Primaria.**

•Revisar eficacia farmacológica por **MAP** cada 3 meses en caso de osteoartritis (rodilla, cadera).

•Se recomienda uso de AINEs a menos dosis y con más frecuencia de dosificación diaria.

PASO 3: TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

- AINEs
- inhibidores COX-2
- Acetaminofen
- Metamizol
- agentes tópicos: capsaicina, lidocaína

•Control por **Enfermería y Fisioterapia de Atención Primaria.**

•Revisar eficacia farmacológica por **MAP** cada 3 meses.

•Ibuprofeno 400-800mg 3veces/día o naproxeno 250-500mg cada 12h.

•**SE DESACONSEJA EL USO DE OPIOIDES:** en caso de uso se recomienda Tramadol a dosis equivalentes de morfina menores de 15mg durante menos de 8 semanas.

ESCALA DE TRATAMIENTO

PRUEBAS RADIOLÓGICAS: RMN

DOLOR **LUMBAR** DE MÁS DE 12 SEMANAS DE DURACIÓN,

+

CON CLÍNICA NEUROLÓGICA (déficit motor, sensitivo y/o incontinencia esfinteriana),

+

QUE **NO** HAYA RESPONDIDO A TRATAMIENTO HABITUAL (analgésicos, antiinflamatorios y/o miorrelajantes y,

+

que **no** tenga realizada en los 2 últimos años RMN en la misma localización por el mismo episodio actual.

PRUEBAS RADIOLÓGICAS: RMN

CERVICALGIA con signos de radiculopatía

+

que **NO HAYA RESPONDIDO A TRATAMIENTO HABITUAL** (analgésicos, antiinflamatorios y/o miorrelajantes)

✓ **DORSALGIA PERSISTENTE** de >12 semanas de duración + **QUE NO HAYA RESPONDIDO A TRATAMIENTO HABITUAL** (analgésicos, antiinflamatorios y/o miorrelajantes y que **no** tenga realizada en los 2 últimos años RMN en la misma localización por el mismo episodio actual.

✓ **DORSALGIA PERSISTENTE** + síntomas piramidales.

✓ **DORSALGIA EN CONTEXTO CLÍNICO** evocador de una patología inflamatoria, tumoral, infecciosa o un traumatismo reciente.

PRUEBAS RADIOLÓGICAS: RMN

RODILLA

- ✓ LESIÓN MENISCAL
- ✓ VALORACIÓN QUIRÚRGICA(criterios inclusión por edad)
- ✓ CONDROPATÍA
- ✓ LESIÓN AGUDA DELIGAMENTOS CRUZADOS O LATERALES
- ✓ SOSPECHA DE LESIÓN CONDRAL O SINOVIAL

HOMBRO

- ✓ LESIÓN AGUDA DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES
- ✓ LESIÓN SUSCEPTIBLE DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- ✓ LESIÓN DE RODETE O GLENOIDES

PRUEBAS RADIOLÓGICAS: RMN

SOLICITUD DE LA PRUEBA:

Deberá solicitarse a través de **Turriano** en solicitud de prueba radiológica en RMN.

En dicha petición deberá incluirse:

- tiempo de evolución
- localización del dolor
- intensidad del dolor
- antecedente traumático o no
- tratamiento prescrito

PRUEBAS RADIOLÓGICAS: RMN

•Se enviará desde las unidades administrativas de cada centro de salud al Servicio de Radiodiagnóstico, al nº de Fax: **925824453**, de la misma manera que se procede con las peticiones de TC craneal en la actualidad, o a la **dirección de correo:** secretaria.radiologia.gaita@sescam.jccm.es

•El Servicio de Radiodiagnóstico se encargará de avisar al paciente telefónicamente, indicándole cómo, cuándo y dónde acudir a la realización de la prueba.

¡NOTA!: Queda a criterios del Servicio de Radiología, la ampliación del estudio radiológico si así se requiriese.

¡NOTA!: en caso de la no cumplimentación correcta de la petición, ésta será devuelta a su prescriptor.

•El resultado informado será visualizado a través de **Ykonos** en un periodo aproximado de 15 días tras la realización de la prueba.

•El informe y la imagen del resultado será valorado por el médico prescriptor y, en función de la misma, el paciente será derivado a la especialidad correspondiente si procede.

PRUEBAS RADIOLÓGICAS: RMN

NO INDICADO	CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS	CONTRAINDICACIONES RELATIVAS
<ul style="list-style-type: none">• En dolor agudo no complicado. <p><u>• Cuando exista en los últimos dos años RMN por episodio asociado a las mismas características actuales.</u></p>	<ul style="list-style-type: none">• Marcapasos cardiacos Y DAI no compatibles con Resonancia. Electrodo cardiacos o cerebrales.• Dispositivos electrónicos implantados (neuroestimuladores, bombas de infusión, prótesis de oídos).• Objetos metálicos en el ojo (bien por operaciones o accidentes, virutas o fragmentos metálicos).• Fragmentos metálicos (placas, tornillos, metralla, etc).	<ul style="list-style-type: none">• Clips vasculares (aneurismas).• Stent, filtros intravasculares, válvulas cardiacas artificiales.• Prótesis (pene, articulaciones).• Marcapasos y DAIs compatibles con resonancia.

PRUEBAS RADIOLÓGICAS: RMN

	Fisioterapia AP	REU	RHB	TRAU
AXIAL	<ul style="list-style-type: none"> - CERVICALGIA Subaguda o Crónica de perfil mecánico no traumática - CERVICOBRAQUIALGIA si ya está diagnosticada - DORSALGIA de perfil mecánico no traumática - LUMBALGIA Subaguda o Crónica de perfil mecánico no traumática - LUMBOCIATALGIA. CIATALGIA. SINDROME PIRAMIDAL si ya están diagnosticados - DEFORMIDADES DEL RAQUIS: ESCOLIOSIS, CIFOSIS del adulto. 	<ul style="list-style-type: none"> - CERVICALGIA subaguda o crónica con algún signo de alarma. - DORSALGIA subaguda o crónica con algún signo de alarma. - LUMBALGIA subagudas o crónicas con algún signo de alarma, o en varón joven de más de 4 semanas de evolución. - DOLOR GLÚTEO o LUMBOGLÚTEO subagudo o crónico de ritmo inflamatorio. 	<p>CERBICOBRAQUIALGIA NO DIAGNOSTICADA</p> <p>LUMBOCIATALGIA. CIATALGIA. SD. PIRAMIDAL NO DIAGNOSTICADOS</p> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> •Presencia o antecedentes familiares de EII •Psoriasis cutánea o ungueal, uveítis. •Fiebre asociada o Sd. Constitucional </div>	
PERIFÉRICA	<ul style="list-style-type: none"> - ARTRALGIAS LOCALIZADAS NO TRAUMATICAS NI DE PERFIL INFLAMATORIO -MONO/OLIGOARTRITIS crónica -POLIARTRITIS crónica- SÍNDROMES DE HOMBRO SIN ANTECEDENTE TRAUMATICO PREVIO(si a la exploración si pasa de 90º de flexión y abducción) - OTRAS TENDINO_ENTESOPATÍAS (Más Prevalentes) <ul style="list-style-type: none"> - EpicondilitisTrocanteritis - Tendinitis De D´quervain - Tendinopatía Rotuliana - Tendinopatía Anserina - Tendinopatía Aquílea 	<ul style="list-style-type: none"> - MONO/OLIGOARTRITIS aguda - POLIARTRITIS aguda - POLIARTRALGIAS de ritmo inflamatorio. - Sd POLIMIALGICO: <ul style="list-style-type: none"> - Dolor en cinturas con o sin afectación sistémica. - Dolor proximal + edema de manos. - Dolor proximal + elevación de RFA. - ARTROSIS con signos de mala evolución: <ul style="list-style-type: none"> - Derrame sinovial o sinovitis. - Artrosis inflamatoria de manos. 	<ul style="list-style-type: none"> - SÍNDROMES DE HOMBRO SIN ANTECEDENTE TRAUMATICO PREVIO(si a la exploración no pasa de 90º de flexión y abducción) - Síndrome Subacromial - Tendinopatías - Capsulitis Adhesiva - Calcificaciones - Rotura Parcial M. Rotador - INTERVENCIONISMO EN RHB: sd. doloroso de hombro y tendinoentesopatías sin respuesta al tratamiento en fisioterapia de AP, para valoración de técnicas. 	
OSTEOPOROSIS/ METABÓLICAS		<ul style="list-style-type: none"> - Fractura o sospecha de fractura por fragilidad. - Incremento del riesgo de fractura. - Sospecha de osteoporosis secundaria. - Valoración de pacientes con riesgo de fractura. 		
INFLAMATORIAS		REU		
FIBROMIALGIA		REU		
ORTOPEDIA			<ul style="list-style-type: none"> - Patología neurológica congénita/perinatal - Amputaciones y agenesias -Patología ortésica de columna y deformidades del raquis - Deformidad craneal postural y tortícolis congénitas 	Patología ortopédica infantojuvenil no neurológica
TRAUMÁTICA				INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

INTERCONSULTAS

Imprescindible en la derivación:

- tiempo de evolución
- localización del dolor
- intensidad del dolor
- antecedente traumático o no
- tratamiento prescrito

• EN CASO DE LA NO CUMPLIMENTACIÓN CORRECTA DEL PIC O

• SI LA DERIVACIÓN NO CUMPLE CRITERIOS CLÍNICOS SEGÚN PROTOCOLO,

SERÁ DEVUELTA AL PRESCRIPTOR

SI HAY DUDAS...

TELÉFONOS DE CONTACTO		
RADIOLOGÍA (8:00 a 20:00h)		26487
REUMATOLOGÍA (8:00 a 15:00h)		86418; 86417
REHABILITACIÓN (8:00 a 15:00h)		86595; 86591; 86598
TRAUMATOLOGÍA (24h)		26486; 26545
URGENCIAS (24H)		28351
Fisioterapia AP		
	TACE	40848
	LA ESTACIÓN	42031
	RÍO TAJO	40215
	LA ALGODONERA	40722
	ALDEANUEVA	40487
	BELVÍS	40370
	CASTILLO	42311
	LOS NAVALMORALES	42444
	OROPESA	40461
	PUENTE	42415
	VELADA	42371