

## INDICACIÓN DE ACTIVACIÓN:

- Shock hemorrágico grado III-IV
- Hemorragia activa previsión transfusión de 4 CH en 2h.

## TRANSFUSIÓN MASIVA:

- Transfusión ½ volumen sanguíneo en 4h
- Transfusión de > 1 volemia en 24h
- Transfusión de 10 CH en 24 horas


Si > 5 CH Rh(D) negativo, pasar a Rh(D) positivo en varón /anciano

## ACTIVAR PROTOCOLO:

1. Designar una persona de apoyo
2. PETICIONES:
  - Hemoderivados: TRF Servicio de transfusión
  - Analítica: URGENTE

PAQUETE	TIEMPO (minutos/ hora)	HEMATÍES (unidades de CH)	PFC (unidades)	PLAQUETAS (pool)
1º	1 min / 0:00h	2 0 -	0	0
2º	30 min / 0:30h	2 isogrupo	1	1
3º	30 min / 1:00h	2 isogrupo	0	0
4º	30 min / 1:30h	2 isogrupo	1	1
5º	30 min / 2:00h	2 isogrupo	0	0
6º	30 min / 2:30h	2 isogrupo	1	1

## LLAMADAS



Tª > 35°C

TAS 80-100 mmHg

SatO2 > 92%

Hb > 7 g/dL

PQ > 50.000/µL

pH > 7.2

AP 60%, INR < 1.4

TTPA <40 segundos

Fibrinógeno >1,5g/L(150 mg/dL)

Calcio iónico: > 1,1mmol/L

Objetivos

DESACTIVAR PROTOCOLO

BANCO DE SANGRE 86057