

RECOMENDACIONES “NO HACER”

1- ANTIBIÓTICOS

- **No** continuar con antibióticos más de 24-48 horas en **pacientes hospitalizados**, a menos que haya evidencia clara de infección. *Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSH).*
- **No** utilizar sistemáticamente antibióticos para el tratamiento de pacientes con **agudizaciones de EPOC** sin datos de gravedad y con un solo criterio Antonhisen (que no sea la purulencia del esputo). *Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).*
- **No** continuar el tratamiento **antibiótico empírico**, iniciado tras ingreso por infección grave, sin valorar diariamente su pertinencia y posible desescalamiento. *Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SeMicyuc).*
- **No** está indicado el tratamiento de la **bacteriuria asintomática**, incluyendo pacientes con sondaje vesical, salvo en embarazo o en procedimientos quirúrgicos urológicos. *Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).*
- **No** tratar de forma empírica la **cistitis no complicada** en mujeres con fluoroquinolonas si existen otras opciones de tratamiento antibiótico oral. *American Urological Association.*

