



ÁREA INTEGRADA
Talavera de la Reina



SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

GUÍA

FARMACOTERAPÉUTICA

Hospital General Universitario

Ntra. Sra. del Prado

**Área Integrada de Talavera de la
Reina**

SESCAM

Marzo 2022

ÍNDICE

1. Guía Farmacoterapéutica.

2. Redacción de la Guía Farmacoterapéutica.

3. Clasificación Anatómico-Terapéutica-Química (ATC) de los medicamentos.

A. Aparato digestivo y metabolismo

B. Sangre y órganos hematopoyéticos

X. Aparato cardiovascular

Δ. Terapia dermatológica

Γ. Terapia genitourinaria (incl. Hormonas sexuales)

H. Terapia hormonal

ϑ. Terapia antiinfecciosa, uso sistémico

Λ. Terapia antineoplásica y agentes inmunomoduladores

M. Sistema musculoesquelético

N. Sistema nervioso

P. Antiparasitarios

R. Aparato respiratorio

S. Órganos de los sentidos

V. Varios

4. Abreviaturas

1.GUÍA FARMACOTERAPÉUTICAgem

La Guía Farmacoterapéutica (GFT) es una herramienta fundamental para los profesionales del Hospital al facilitarles la información básica de los medicamentos disponibles. Constituye el vehículo de transmisión de la política de selección y utilización de los medicamentos en el Hospital General Universitario Ntra. Sra. del Prado. Dicha política se elabora en el marco de la Comisión de Farmacia y Terapéutica mediante un proceso dinámico e interdisciplinar.

La selección de medicamentos se realiza aplicando criterios de eficacia y seguridad, coste-efectividad, aportación al arsenal terapéutico ya existente y repercusión en el área sanitaria, de manera que garantice las necesidades terapéuticas de los pacientes atendidos en el Hospital General Ntra. Sra. del Prado. Esta selección es una herramienta fundamental para mejorar la calidad del proceso farmacoterapéutico con criterios de eficiencia.

Los medicamentos relacionados en la GFT se encuentran ordenados siguiendo la clasificación ATC (Anatomo-Terapéutica y Química) de la OMS. Dentro de cada grupo terapéutico figuran el principio activo o sus asociaciones, indicándose las formas farmacéuticas disponibles y las vías de administración más usuales. En esta nueva edición de la Guía Farmacoterapéutica, se incluye el apartado de OBSERVACIONES, donde se recoge información sobre las condiciones especiales de conservación y dispensación, consejos de administración y dosificación en situaciones especiales, interacciones, equivalencias terapéuticas, necesidad de monitorización, etc.

La GFT está disponible en formato electrónico en la página web del hospital lo que permite que esté actualizada casi a tiempo real, incluyendo las altas y bajas que se vayan produciendo.

Señalar que los nombres comerciales que aparecen en esta Guía únicamente tienen finalidad orientativa y, por tanto, pueden ser sustituidos por otras especialidades de idéntica composición siempre que éstas cumplan los correspondientes estándares de calidad.

Para buscar cualquier fármaco, hay que ir a "Edición" y pinchar en "Buscar" (es conveniente verificar que las opciones de búsqueda sean lo más amplias posible (ej. no restringir a mayúsculas o minúsculas, no restringir al inicio de palabra....))

2.REDACCIÓN

Servicio de Farmacia: M^a Antonia Berrocal Javato, Beatriz García Esteban, Beatriz de la Calle Riaguas, Beatriz González Joga, M^a Carmen Iranzu Aperte, Clara Piqueras Romero.

A-APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO

A01A- Estomatológicos

A01AB-Antiinfeciosos y antisépticos para tratamiento oral local

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Clorhexidina	Sol 400 ml	OR	Administrar previa higiene bucal
Hexetidina	Sol 200ml	OR	Administrar previa higiene bucal
Miconazol	Gel 2% 40 g	OR	Administrar previa higiene bucal. Mantener en la boca el mayor tiempo posible (al menos 15min) y después ingerir. Tras la desaparición de los síntomas, prolongar el tratamiento al menos 48h.
Nistatina	Susp 100000 UI/ml	OR	Agitar antes de usar. Administrar después de las comidas previa higiene bucal. Mantener en la boca el mayor tiempo posible y luego ingerir. Continuar el tratamiento 48h después de desaparecer los síntomas.
Nistatina + Tobramicina + Colistina	Pasta 1,6 g Susp 10 ml	OR	Pasta orofaríngea FM Suspensión Descontaminante FM

A02-FÁRMACOS PARA ALTERACIONES RELACIONADAS CON LA ACIDEZ

A02A-Antiácidos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Almagato	Sobres 1,5g/15ml	OR	Interacciona en la absorción de muchos fármacos: distanciar su administración de cualquier otro medicamento. Magaldrato y asociaciones de antiácidos con derivados de Aluminio y Magnesio son medicamentos no incluidos en la Guía y se consideran equivalentes terapéuticos de ALMAGATO. Ajustar en IR. No se recomienda su uso en pacientes con IR grave.
Aluminio hidróxido(Algedrato)	Comp 233mg	OR	Evitar su uso prolongado en pacientes con IR
Bicarbonato sódico	Comp 500mg Sobre 1 g	OR	

A02B-Fármacos para la úlcera péptica y reflujo gastro esofágico

A02BA-Antiulcerosos: Antagonistas del receptor H2

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Citrato sódico	Sol 250 ml	OR	Citrato sódico FM
Famotidina	Comp 20 mg Amp 20mg 2ml	OR IV, PERF IV	Suspensión de todos los registros nacionales que incluyen RANITIDINA Ajuste de dosis en pacientes con IR grave o moderada. Forma iv uso restringido

A02BC-Antiulcerosos: Inhibidores de la bomba de protones

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Esomeprazol	Comp 40 mg Vial 40 mg 5 ml	OR/SNG IV, PERF IV	Todos los IBP son equivalentes terapéuticos a dosis comparables en las vías e indicaciones comunes. Por vía oral se recomienda la utilización de omeprazol por ser el más coste-efectivo Esomeprazol restringido a pacientes con SNG. Alerta AEMPS: interacción omeprazol/esomeprazol-clopidogrel: disminución del efecto antiagregante. Se recomienda ranitidina o pantoprazol
Omeprazol	Caps 20mg Vial 40mg 10 ml	OR PERF IV	
Pantoprazol	Comp. 40 mg Vial 40 mg	OR PERF IV	

A02BX- Otros fármacos para la úlcera péptica y el reflujo

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Sucralfato	Sobres 1g	OR	Espaciar la administración con antiácidos. Consultar las interacciones de absorción con otros fármacos.

A03-FÁRMACOS PARA ALTERACIONES FUNCIONALES GASTROINTESTINALES

A03A-Antiespasmódicos y anticolinérgicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Butilescopolamina bromuro	Comp. 10 mg Amp 20mg/ml	OR IV,IM, SC	
Butilescopolamina + Metamizol	Gg 10/250 mg Amp 20mg + 2500mg/ 5ml	OR IM, IV	Ajustar en IR.
Simeticona	Comp. 40 mg Gotas 10mg/ml 25 ml	OR OR	La duración del tratamiento no debe superar los 10 días

A03B-Alcaloides de la belladona

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Atropina	Amp 1mg/ml 1ml	IV,IM,SC	

A03F-Procinéticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Domperidona	Caps 10 mg Susp 5 mg/5 ml 200 ml	OR OR	Atraviesa menos la barrera hematoencefálica que el resto de fármacos del grupo. Ajustar en IR. Precaución en IR e IH graves. Se recomienda administrar 15-20 min. antes de las comidas Alerta AEMPS: Restringe uso solo para tratamiento de náuseas y vómitos https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_04-2014-domperidona.htm
Metoclopramida	Sol 1mg/ml 10 ml Amp 5mg/ml 2ml	OR IM,IV, PERF IV	Ajustar en IR. Precaución en IR e IH graves La levodopa y la metoclopramida son mutuamente antagonistas Alerta AEMPS: no superar los 5 días de tratamiento

A04-ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Fosaprepitant	Vial 150 mg	PERF IV	Dosis única prequimioterapia
Escopolamina	Amp 0,5mg/ml 1ml	IM, IV, SC	
Ondansetrón	Comp 4mg Comp 8mg Amp 2mg/ml 2ml Amp 2mg/ml 4ml	OR OR IV, IM, PERF IV IV, IM, PERF IV	Precaución en IH Protocolo de uso

A05-TERAPIA HEPATOBILIAR

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Ácido ursodesoxicólico	Comp 150mg Cap 300 mg	OR	Se procurará mantener una dieta moderada en calorías y colesterol. Se recomienda evitar aquellos medicamentos que produzcan acumulación biliar de colesterol, como estrógenos y anticonceptivos hormonales.

A06-LAXANTES

A06AA-Laxantes: lubricantes y emolientes

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Aceite de parafina + picosulfato sódico	Sobres 15 ml	OR	Composición por sobre: 7,174 g parafina líquida + 4,5 mg picosulfato sódico

A06AB-Laxantes de contacto

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Picosulfato sódico + óxido de magnesio + ac. Cítrico anhidro	Sobres 15 g	OR	Composición por sobre 10 mg picosulfato sódico + 3,5 óxido magnesio Contraindicado en pacientes con función renal gravemente reducida

A06AC-Laxantes formadores de volumen

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Ispágula (Plantago ovata)	Sobres 3,5mg	OR	Se recomienda administrar con abundante cantidad de agua. Los laxantes incrementadores del bolo son los más indicados para tratamientos prolongados.

A06AD-Laxantes osmóticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Fosfato sódico	Fco 36g/45ml	OR	
Lactitol	Sobre 10 g	OR	
Lactulosa	Jbe 3,3g/5ml 800ml Sobre 10g/15ml.	OR/REC OR	
Peptina + fosfato sódico + sales de magnesio	Polvo 65 g	OR	
Macrogol (Polietilenglicol + electrolitos)	Sobre 13,8 g	OR	
Solución evacuante de polietilenglicol	Sobre 17,6 g	OR	

A06AG-Laxantes: enemas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Laurilsulfato sódico + Citrato sódico (Enema detergente)	Canuleta 5ml	REC	
Fosfato sódico	Enema 140ml Enema 250ml	REC REC	

A06AX-Otros laxantes

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Glicerina	Sup 0,96 g Sup 1,44 g	REC REC	Supositorios de glicerina lactantes Supositorios de glicerina niños
Suero fisiológico	Sol 66ml	REC	Enema salino Lainco

A07-ANTIIDIARREICOS, ANTIINFECCIOSOS Y ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES

A07AA-Antiinfeciosos intestinales: antibióticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Rifaximina	Comp 200 mg	OR	Se aconseja no sobrepasar los 7 días de tratamiento.

A07B-Adsorbentes intestinales

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Carbon activado	Fco 50g	OR	No adsorbe (o mínimamente) cianuros, etanol, etilenglicol, sales de hierro y litio, por lo que puede resultar ineficaz en estas intoxicaciones. No emplear en intoxicaciones por productos corrosivos del tipo ácidos y bases fuertes. Una vez preparada la suspensión, administrar inmediatamente o guardar en nevera (4-8°C) no más de 72 horas.

A07CA-Fórmulas para rehidratación oral

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Glucosa+Electrolitos (Sodio, Potasio y otros)	Sobres 20g Sobres 20g	OR OR	Ambas presentaciones contienen por sobre: 20g de glucosa + 1'5g de cloruro potásico + 2'9g de citrato sódico. Difieren en la cantidad de cloruro sódico: mientras que el Sueroral casen tiene 3'5g, el hiposódico sólo 1'2g.

Maltodextrina + Electrolitos	Brick 200 ml	OR	Cada sobre se diluye en 1 litro de agua. Bi-Oral Suero
------------------------------	--------------	----	---

A07DA-Inhibidores de la motilidad intestinal

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Loperamida	Caps 2mg	OR	

A07EA-Antiinflamatorios intestinales: corticosteroides de acción local

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Budesonida	Enema 2 mg	REC	

A07EC-Ácido aminosalicílico y similares

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Mesalazina (Acido 5-aminosalicílico) (5-ASA)	Comp 500mg Sobre 1 g Espuma rectal 1 g/aplic Supos 500 mg	OR OR REC REC	Precaución en embarazo, IH e IR. Ajustar en IR.
Sulfasalazina	Comp 500 mg	OR	Los comprimidos no deben ser masticados.

A07FA-Microorganismos antidiarreicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Saccharomyces Boulardi	Caps 50 mg	OR	Ultra levura. Nota de seguridad de la AEMPS
Lactobacillus Reuteri	Comp 450 mg	OR	Casenbiotic Disponibilidad por paciente

A09-ENZIMAS PANCREÁTICOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Pancreatina	Caps (Unidades USP: Lipasa 10000 + Amilasa 8000 + Proteasa 600)	OR	Kreon 10000 U
	Caps (Unidades USP: Lipasa 25000+ Amilasa 18000+ Proteasa 1000)	OR	Kreon 25000 U

A10-ANTIDIABÉTICOS

A10A-Insulinas Todas las presentaciones se deben conservar en refrigeración (2-8°C) Medicamentos de alto riesgo

TIPO	NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
RÁPIDA	Normal (soluble o regular)	Vial 100 UI/ml 10ml	SC, IV	Humulina vial
		Reloj 100 UI/ml 3ml (innolet)	SC, IV	Actrapid innolet
	Insulina aspart	Pluma 100 UI/ml 3ml (pen)	SC	Novorapid flexpen
	Insulina asparta + nicotinamida	Pluma 100 UI/ml 3ml (pen)	SC	Fiasp flexpen
	Insulina Glulisina	Vial 100 UI/ml vial 10 ml Pluma 100 UI/ml 3 ml	SC	Apidra Apidra Solostar
INTERMEDIA	Insulina lispro-protamina (NPL)	Pluma 100 UI/ml 3ml (pen)	SC	Humalog mix
	Insulina NPH (isofánica)	Vial 100 UI/ml 10ml (1) Pluma 100 UI/ml 3ml (pen)	SC SC	Insulatard vial Insulatard flexpen
LENTA	Insulina degludec	Pluma 100 UI/ml 3 ml	sc	Tresiba
	Insulina detemir	Pluma 100 UI/ml 3ml (pen)	SC	Levemir flexpen
	Insulina glargina	Pluma 100UI/ml 3ml	SC	Lantus Solostar*
		Pluma 300 Ui/ml 1,5 ml	SC	Toujeo
	Insulina glargina biosimilar	Pluma 100UI/ml 3ml	SC	Abasaglar*
BIFÁSICA	Insulina regular 30% + Insulina isofánica 70%	Vial 100 UI/ml 10 ml	SC	Mixtard 30 vial
		Reloj 100 UI/ml 3ml (innolet)	SC	Mixtard 30 innolet
	Insulina Lispro 25% + Insulina Lispro-Protamina 75%	Pluma 100 UI/ml 3ml (pen)	SC	Humalog Mix 25
	Insulina Lispro 50% + Insulina Lispro-Protamina 50%	Pluma 100 UI/ml 3ml (pen)	SC	Humalog Mix 50
	Insulina Aspart 30% + Insulina Aspart-Protamina 70%	Pluma 100 UI/ml 3ml (pen)	SC	Novomix 30 flexpen

* EQUIVALENTES TERAPÉUTICOS, el fármaco concreto que existirá en cada momento será el que resulte del procedimiento público de adquisiciones.

A10B-Antidiabéticos orales. Medicamentos de alto riesgo

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Acarbosa	Comp. 50 mg	OR	<i>Contraindicado en IR e IH graves</i>
Glibenclamida	Comp 5 mg	OR	<i>Medicamento de alto riesgo Ajustar en IR. Contraindicado en IR e IH graves (cambio a insulina) Precaución en pacientes con deficiencia de G6PD</i>
Glicazida	Comp retard 30mg	OR	<i>Medicamento de alto riesgo Ajustar en IR. Contraindicado en IR e IH graves Precaución en pacientes con deficiencia de G6PD</i>
Glimepirida	Comp. 4 mg	OR	<i>Medicamento de alto riesgo Precaución en pacientes con deficiencia de G6PD Ajustar en IR. Contraindicado en IR e IH graves</i>
Glipizida	Comp 5 mg	OR	<i>Medicamento de alto riesgo Ajustar en IR. Contraindicado en IR e IH graves Precaución en pacientes con deficiencia de G6PD</i>
Metformina	Comp 850 mg	OR	<i>Medicamento de alto riesgo Ajustar en IR. Contraindicada en IR e IH</i>
Repaglinida	Comp 0,5mg Comp 1mg Comp 2mg	OR OR OR	<i>Medicamento de alto riesgo</i>

A11-VITAMINAS

A11BA-Polivitamínicos, solos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Multivitamínico	Vial Vial 10ml Amp 10ml	IV, IM, PERF IV IV IV	<i>Cernevit (niños): Nicotinamida, Dexpantenol, Ácido fólico, Tocoferol, Piridoxina Hidrocloruro, Colecalciferol, Biotina, Cianocobalamina, Cocarboxilasa, Riboflavina Fosfato Sodio, Ácido ascórbico, Retinol Palmitato. Soluvit: Pantotenato Sodio, Nicotinamida, Ácido fólico, Piridoxina Hidrocloruro, Biotina, Cianocobalamina, Tiamina Nitrato, Riboflavina Fosfato Sodio, Ascorbato Sodio Vitalipid: Ergocalciferol, Fitomenadiona, Tocoferol, Retinol Palmitato. Aditivos Nutrición Parenteral</i>
Multivitamínicos	Gts 10ml Comp	OR OR	<i>Protovit gotas Elevit Pacientes con fibrosis quística</i>

A11CA-Vitamina A, sola

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Vitamina A (Retinol)	Caps 50000 UI	OR	<i>Auxina A masiva. Ajustar en IR.</i>

A11CC-Vitamina D y análogos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Calcitriol	Caps 0,25mcg	OR IV	<i>Un requisito indispensable para alcanzar la eficacia óptima de calcitriol es un aporte adecuado de calcio (en adultos, 800-1000 mg/24 horas). Realizar control de calcemia cada mes.</i>
Paricalcitol	Vial 2 mcg/ml 1ml	IV	<i>Zemplar</i>

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Vitamina D3 (Colecalciferol)	Sol 2000 UI/ml.10ml (0,5mg/ml)	OR	3 gotas = 200 UI. Ajustar en IR.

A11D-Vitaminas B

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Vitamina B1 (Tiamina)	Comp 300mg Amp 100mg/ml 1ml	OR IM	La administración de tiamina puede producir reacciones agudas de hipersensibilidad, sobre todo vía IV (angioedema, distrés respiratorio, colapso vascular).
Vitamina B1+B6+B12	Comp 250/250/0,5mg	OR	Contraindicado en IR e IH

A11HA-Otras vitaminas, solas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Vitamina B6 (Piridoxina)	Comp 300mg Amp 150mg/ml 2ml	OR IV,IM	Contraindicado en IR e IH
Vitamina E (Tocoferol)	Comp 50mg Comp 200mg	OR OR	Está contraindicado administrar dosis elevadas de Vitamina E a personas que estén en tratamiento con anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K 1 mg= 1.5 UI.
Vitamina H (Biotina)	Comp 5mg	OR	Medebiotin fuerte Disponibilidad por paciente

A11J-Combinaciones de vitaminas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Retinol + Tocoferol	Caps 5000 UI + 10mg	OR	Ajustar en IR. Contraindicado en IR e IH graves
Polivitamínico B + Vitamina C	Grageas	OR	Becozyme C forte

A12-SUPLEMENTOS MINERALES

A12A-Suplementos minerales: calcio

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Calcio cloruro	Amp 10% 10ml	IV, PERF IV	Ajustar en IR. 1ml contiene 18'24 mg de Ca ²⁺ (0,914mEq)
Calcio carbonato	Comp 500mg	OR	Mastical. Ajustar en IR.
Calcio gluconato	Amp 0'46mEq/ml 10ml	IV	Suplecal. Ajustar en IR. 1ml contiene 9'1 mg de Ca ²⁺ (0,46mEq, 0.23 mmol)
Calcio, carbonato + Colecalciferol	Comp. 600 mg + 400 UI	OR	Ajustar en IR.

TABLA. Contenido en Ca elemento de los preparados comerciales más empleados

SAL DE CALCIO Nombre comercial	PRESENTACIÓN	PESO SAL POR UNIDAD (mg)	Ca ²⁺ elemento por unidad*			VÍA DE ADMÓN.
			mg	mmol	mEq	
CARBONATO						
Caosina®	sobr	2500	1000	25	50	oral
Carbocal®	comp	1500	1000	25	50	oral
Mastical®	comp mastic	1250	500	12.5	25	oral
Natecal 600®	comp mastic	1500	600	15	30	oral
CLORURO						
Cloruro Cálcico Braun®	amp 10 ml (al 10%)	1000	182	4.56	9.12	iv
FOSFATO						
Calcio 20 Emuls®	emuls	104/5ml	41.6/5 ml	1.04/5 ml	2.08/5 ml	oral
Ostram®	sobr	3300	1276	32	64	oral
GLUCONATO						
Suplecal®	amp 10 ml (al 10%)	1000	93	2.32	4.65	iv
HIDROXIAPATIT A						
Osteopor®	comp recub	830	178	4.45	8.9	oral
CARBONATO-LACTOGLUCONATO						
Calcium Sandoz Forte®	comp eferv	875/1132	500	12.5	25	oral

*Equivalencias: 1g= 25 mmol= 50 mEq de Ca elemento

A12B-Suplementos minerales: potasio

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Potasio, Cloruro	Cap 600 mg (8 mEq K elemento/unidad)	OR	Potasion® Ajustar en IR. Contraindicado en IR grave
Potasio ascorbato Potasio ascorbato + aspártico ac	Comp efervescentes (10 mEq K elemento/unidad) Comp efervescentes (25 mEq K elemento/unidad)	OR	Ajustar en IR. Contraindicado en IR grave

A12CC-Otros suplementos minerales: sodio

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Sodio cloruro	Sobres 1 g	OR	Cloruro sódico sobres

A12CC-Otros suplementos minerales: magnesio

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Magnesio sales	Comp 404,85 mg	OR	Magnesio Boi®. Ajustar en IR. Un comprimido contiene 47,5mg Mg ²⁺ = 3,9 mEq Containdicado en IR grave

A12CX-Otros productos minerales

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Fosfato sódico monobásico	Sobres 3.56 g (800 mg de fósforo)	OR	CDR 800 mg Ingerir 1 sobre al día por VO Evitar en IR grave

A16AX-Otros productos para el aparato digestivo y metabolismo.

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Nitisinona	Cáps 2 mg Caps 5 mg Caps 10 mg Caps 20 mg	OR OR OR	Orfadin Nevera

B-SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

B01-ANTITROMBÓTICOS

B01AA-Antitrombóticos: Antagonistas de vitamina K

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Acenocumarol MP3	Comp 4mg	OR	Medicamento peligroso MP3 Medicamento de alto riesgo Valorar su administración y/o sustitución temporal por HBPM en el perioperatorio. Contraindicado en embarazo (es teratógeno) Ajustar en IR. Existe comercializado acenocumarol comp 1mg (Sintrom® uno); precaución con esta presentación y posibles confusiones de posología.

B01AB- Antitrombóticos: heparina y derivados (I)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Enoxaparina biosimilar	Jer 20 mg (2000 UI) /0,2 ml Jer 40mg (4000 UI)/0,4 ml Jer 60 mg (6000 UI)/0,6 ml Jer 80 mg (8000 UI) /0,8 ml Jer 100 mg (10000 UI)/1 ml Jer 120mg/0,8ml Jer 150mg/1 ml	SC SC SC SC SC SC SC	Medicamento de alto riesgo. Ajustar en IR.
Heparina Sódica	Vial 25000 UI/ml 5ml Vial 5000 UI/ml 5ml Vial 20 UI/ml 3 ml (2)	IV IV Catéteres	Puede ser necesaria una dosis menor en IR e IH. Las soluciones de HEPARINA SÓDICA están tituladas de forma que 1mg = 100 UI. La Heparina sódica al 5% contiene 50mg/ml, la Heparina sódica al 1% contiene 10mg/ml. (2) Para heparinización de catéteres. Medicamento de alto riesgo
Antitrombina	1000 UI polvo + disolvente	IV	Anbinex Uso restringido Medicamento de alto riesgo
Fondaparinux	Jeringa 2.5 mg 0.5 ml	SC	Arixtra Uso restringido Medicamento de alto riesgo. Ajustar en IR.

B01AC-Antiagregantes plaquetarios

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Ácido acetilsalicílico	Comp 100mg Caps lib. prolong.150 mg Comp y Caps lib. prolong.300mg Comp 500 mg	OR OR OR OR	Ajustar en IR. Contraindicado en IR o IH grave
Clopidogrel	Comp 75mg Comp 300 mg	OR	Contraindicado en IH grave
Dipiridamol	Amp 5mg/ml 2ml	PERF IV	Medicamento de alto riesgo
Epoprostenol (Prostaciclina)	Vial 10mcg/ml 50ml	PERF IV	Medicamento de alto riesgo
Prasugrel	Comp recub 10 mg	OR	Medicamento con protocolo de uso
Tirofiban	Sol 0,05mg/ml 250ml	PERF IV	Tirofiban y eptifibátida son alternativas terapéuticas equivalentes a dosis comparables Medicamento de alto riesgo Ajustar en IR.
Teprostinil	Vial 5 mg/ml 20 ml	PERF IV	Exclusivamente para pacientes con hipertensión pulmonar. Disponibilidad por paciente. Medicamento de alto riesgo
Triflusal	Caps 300 mg	OR	Disgren . Precaución en IR.
Ticagrelor	Comp recub 90 mg	OR	Brilique Medicamento con protocolo de uso

B01AD-Antitrombóticos: enzimas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Alteplasa (rt-PA) (Activador tisular del plasminógeno)	Vial 1mg/ml 50ml	PERF IV	Medicamento de alto riesgo
Tenecteplasa (TNK-tPA)	Vial 10.000 UI Vial 8.000 UI	IV	Medicamento de alto riesgo
Uroquinasa	Vial 100.000 UI	PERF IV, Instilación catéter	Medicamento de alto riesgo Contraindicado en disfunción hepática grave

B01AF-Inhibidores directos del Factor Xa

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Apixaban	comp. recub 2,5 mg Comp. recub 5 mg		Medicamento de alto riesgo. Ajustar en IR.
Edoxaban	Comp. recub 60 mg Comp. recub 30 mg	OR	Medicamento de alto riesgo. Dosis habitual 60 mg/día, bajar a 30 mg si peso ≤ 60 kg, IR moderada a grave, tratamiento con ciclosporina, dronedarona, eritromicina y ketoconazol.
Rivaroxaban	Comp. recub 10 mg Comp. recub 15 mg Comp. recub 20 mg	OR	Medicamento de alto riesgo. Ajustar en IR.

B01AE-Inhibidores directos de la trombina

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Dabigatran	Caps. duras 150 mg	OR	Medicamento de alto riesgo. Ajustar en IR.

B02-ANTIHEMORRÁGICOS

B02AA-Antifibrinolíticos: Aminoácidos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Acido aminocaproico	Amp 400mg/ml 10ml	OR, IV, PERF IV	Precaución en IR Ampollas bebibles
Ácido tranéxico	Comp 500mg Amp 100mg/ml 5ml	OR IV, PERF IV	Ajustar en IR. Contraindicado en IR grave Ampollas bebibles Protocolo de uso fuera de ficha para profilaxis hemorragia en cirugía de rodilla

B02AA-Antifibrinolíticos: inhibidores de proteinasa

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Alfa-1-antitripsina	Vial 1g	PERF IV	Disponibilidad por paciente

B02B-Vitaminas K y otros hemostáticos

B02BA-Vitamina K

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Vitamina K1 (Fitomenadiona)	Amp 10mg/ml 0,2ml Amp 10mg/ml 1ml	IV,IM,OR IV,IM,OR	Ampollas bebibles

B02BB- Fibrinógeno

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Fibrinógeno	Vial 1g	PERF IV	Precaución y seguimiento estricto en pacientes con IH

B02BC-Hemostáticos locales

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Fibrina	Jer prec+jer prec 5 ml Jer prec+ Jer prec 2 ml	TOP	Conservar congelado Medicamento de especial control (cirugía y oftalmología)
Fibrinógeno + trombina	Esponja 9,5 x 4,8cm	TOP	Medicamento de especial control Contiene por 1cm: 5,5mg fibrinógeno + 2 UI trombina.
Gelatina porcina absorbible	Film 20x7x0,05cm Esponja 8 x3 cm	TOP TOP	Espongostan film láminas Espongostan tapones

B02BD-Factores de coagulación sanguínea (Disponibilidad por paciente)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Factor VII a recombinante (Eptacog alfa) (activado)	Vial 100 KUI (2 mg) Vial 250 KUI (5 mg)	IV IV	Precaución en enfermedad hepática grave Nevera
Factor VIII humano	Vial 1000 UI Vial 500 UI	IV IV	Se recomienda la vacunación de hepatitis B en todos los pacientes hemofílicos con serología negativa para VHB. Los hemofílicos con grupo sanguíneo A, B y AB pueden sufrir hemólisis. Nevera
Factor IX humano	Vial 1000 UI	IV	Contraindicado en casos de CID y/o hiperfibrinólisis. Nevera
Complejo de protrombina humano (Factor II,VII,IX,X asociados)	Vial 500 UI	IV	Se recomienda estrecha vigilancia si se administra en pacientes con enfermedad hepática Nevera

B03-ANTIANÉMICOS

B03A-Hierro

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Hierro glicinasulfato (Fe2+)	Caps 100 mg	OR	La administración concomitante de sales de hierro con agentes antiinflamatorios no esteroideos puede intensificar el efecto irritante en la mucosa gastrointestinal. Espaciar la administración de: fluoroquinolonas, hormonas tiroideas, tetraciclinas, bisfosfonatos, levodopa y calcio.
Hierro sulfato (Fe2+)	Gts 25 mg/ml 30 ml	OR	Glutaferro Para uso en niños
Complejo Hierro III sacarosa (1)	Vial 20 mg/ml 5 ml	IV, PERF IV	
Hierro III carboximaltasa	Vial 50 mg/ml 10 ml	IV, PERF IV	Restringido a pacientes de Cardiología.

Nota 1: HIERRO SACAROSA: Administración

Precauciones: se administrará únicamente por vía intravenosa, bien mediante inyección intravenosa lenta o bien mediante perfusión intravenosa por goteo. Sin embargo, la vía de administración preferida es la perfusión intravenosa por goteo ya que, de este modo puede reducirse el riesgo de que se produzcan episodios de hipotensión y extravasación venosa.

Perfusión intravenosa por goteo: deberá diluirse únicamente en una solución de cloruro de sodio al 0,9% (solución salina normal). Deberá diluirse una ampolla de 5 ml (100 mg de hierro) en un máximo de 100 ml de solución salina al 0,9%. Por motivos de estabilidad no se permiten

diluciones de concentraciones más bajas.

Inyección intravenosa: La administración mediante inyección intravenosa lenta podrá llevarse a cabo a un ritmo de 1 ml de solución no diluida por minuto (es decir, 5 minutos por ampolla), sin exceder 2 ampollas (200 mg de hierro) por inyección.

Hierro Sacarosa es una solución fuertemente alcalina y **no puede administrarse vía subcutánea o vía intramuscular**. Evitar extravasación.

La administración demasiado rápida puede causar hipotensión.

PREPARADOS DE HIERRO DE ADMINISTRACIÓN IV Y REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD: RECOMENDACIONES DE LA AEMPS (Julio 2013):

- Utilizar estos preparados sólo en lugares con acceso inmediato a medidas de tratamiento de emergencia de reacciones de hipersensibilidad.
- Vigilar al paciente al menos durante 30 minutos después de la administración, no recomendándose la administración de dosis de prueba.
- Utilizar durante el embarazo únicamente en casos necesarios, reduciendo su uso al segundo y tercer trimestre del mismo.

B03B-Vitamina B12 y ácido fólico

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Acido fólico	Comp 5mg	OR	Contraindicado en anemia megaloblástica por deficiencia de B12

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	Amp 0,5mg/ml 2ml	IM	<i>Durante el tratamiento inicial en pacientes con anemia perniciosa se debe vigilar cuidadosamente el potasio en suero durante las primeras 48 horas, y si fuese necesario, debe ser suplementado. Se deberá advertir al paciente sobre el riesgo de tomar ácido fólico en vez de vitamina B12, porque el ácido fólico puede resolver la anemia pero no los síntomas neurológicos.</i>

B03XA-Otros antianémicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Epoetina alfa	Jer prec 10.000 UI / 1 ml Jer prec 20.000 UI / 1 ml Jer prec 30000 UI / 1 ml Jer prec 40.000 UI / 1 ml	IV, SC	<i>Nevera</i>
Epoetina zeta	Jer prec 1000 UI / 0,3ml Jer prec 2000 UI / 0,6ml Jer prec 3000 UI / 0,9ml Jer prec 4000 UI / 0,4ml Jer prec 5000 UI / 0,5ml Jer prec 6000 UI / 0,6 ml Jer prec 8000 UI / 0,8 ml	IV, SC IV, SC IV, SC IV, SC IV, SC	<i>Nevera</i>
Darbepoetina	Jer prec 10 mcg Jer prec 20 mcg Jer prec 30 mcg Jer prec 40 mcg Jer prec 50 mcg Jer prec 60 mcg Jer prec 80 mcg Jer prec 100 mcg	IV, SC IV, SC IV, SC IV, SC IV, SC IV, SC IV, SC IV, SC	<i>Nevera</i>

B05-SUSTITUTOS DEL PLASMA Y SOLUCIONES PARA INFUSIÓN

B05AA-Sustitutos del plasma y fracciones proteicas plasmáticas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Albúmina humana	Vial 200mg/ml 50 ml	PERF IV	
Gelatina	Frasco 40 mg/ml 500 ml	PERF IV	<i>Debe administrarse con precaución en pacientes con función renal gravemente deteriorada</i>

B05B-Soluciones endovenosas

B05BA-Soluciones para nutrición parenteral (Ver anexo B2: Composición de Nutriciones parenterales)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Aceite de soja/Triglicéridos de cadena media (LCT/MCT)	Emulsión 10 g/100 ml 500 ml Emulsión 20 g/100 ml 100 ml Emulsión 20 g/100 ml 250 ml Emulsión 20 g/100 ml 500 ml	PERF IV PERF IV PERF IV	<i>Lipofundina 20%</i>
Aminoácidos estándar adultos	Sol 8,5 g/100 ml 500 ml Sol 10 g/100 ml 500 ml Sol 12,6 g/100 ml 500 ml	PERF IV PERF IV PERF IV	<i>Vamin 14 sin electrolitos Tauramin 10% Tauramin 12,6%</i>
Aminoácidos estrés adultos	Sol 9,9 g/100 ml 500ml	PERF IV	<i>Aminoplasmal PO 10%</i>
Aminoácidos insuficiencia renal	Sol 10 g/100 ml 250ml	PERF IV	<i>Nephroprotect</i>
Aminoácidos insuficiencia hepática	Sol 8 g/100 ml 500ml	PERF IV	<i>Aminosteril N-Hepa 8%</i>
Aminoácidos pediátricos	Sol 10 g/100 ml 250 ml	PERF IV	<i>Aminoven infant 10%</i>
Aminoácidos + Glucosa 5%+electrolitos	Sol 3,09% 1000ml	PERF IV	<i>Isoplasmal</i>
Nutrición parenteral total central	Bolsa multicom. 2300 Kcal/2566 ml	PERF IV	<i>Kabiven 2566 ml</i>
Glucosa (Dextrosa)	Bolsa 5 g/100 ml 50ml (libre de PVC) Bolsa 5 g/100 ml 100 ml (libre de PVC) Bolsa 5 g/100 ml 250 ml (libre de PVC) Bolsa 5 g/100 ml 500 ml (libre de PVC) Fco 5 g/100 ml 250 ml vidrio Fco 10 g/100 ml 250ml vidrio Plast.rígido 10 g/100 ml 100 ml (sin PVC) Fco 20 g/100 ml 250 ml vidrio Fco 20 g/100 ml 500 ml vidrio	PERF IV PERF IV PERF IV PERF IV PERF IV PERF IV PERF IV PERF IV PERF IV PERF IV	<i>Viaflo Glucosa 5% 50 ml Glucosada grifols 5% Suero Glucosa 10% Glucosado 20% Hipertónico Glucosa 30% hipertónico</i>

	Fco 30 g/100 ml 500ml vidrio Fco 40 g/100 ml 500ml vidrio Bolsa 50 g/100 ml 500ml (con PVC) Fco 50 g/100 ml 100 ml vidrio (1)	PERF IV PERF IV	Glucosa 40% hipertónico Glucosa 50% hipertónico (1) Glu 50% 100 ml. Sustituye a Glucosmon R50%
--	--	--------------------	--

B05BB-Soluciones que afectan al equilibrio hidroelectrolítico

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Sodio Cloruro (NaCl)	Sol 0,9 g/100 ml 50 ml (libre de PVC) Sol 0,9 g/100 ml 100 ml (libre de PVC) Sol 0,9 g/100 ml 250 ml (libre de PVC) Fco 0,9 g/100 ml 250 ml vidrio Sol 0,9 g/100 ml 500 ml (libre de PVC) Sol 0,9 g/100 ml 1000 ml (libre de PVC) Sol 0,45 g/100 ml 500 ml vidrio	PERF IV PERF IV PERF IV PERF IV PERF IV PERF IV PERF IV	Suero Fisiológico 0,9% Cloruro sódico 0,45%
Glucosa + Sodio Cloruro	Bolsa 3,3 g+0,3 g/100 ml 500 ml (libre de PVC) Bolsa 5 g + 0,2 g/100 ml 500ml (con PVC)	PERF IV PERF IV	Glucosalino isotónico(Glucosalino 1/3) Glucosalino 1/5
CaCl +KCl+NaCl+Sodio lactato	Bolsa (129,9 Na+5,4 K+3,6 Ca+27,2 Lactato+11,7 Cl/mEq100 ml) 500ml (libre PVC)	PERF IV	Ringer lactato
Na+K+Ca+Mg+Cl+Acetato	Sol 75 ml	PERF IV	Hyperlite Exclusivamente aditivo para Nutrición Parenteral

B05BC-Soluciones productoras de diuresis osmótica

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Manitol	Fco 10 g/100 ml 500 ml Fco 20 g/100 ml 500ml	PERF IV PERF IV	Manitol 10% Manitol 20%

Anexo B1: SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE GRAN VOLUMEN.

Contenido de las soluciones IV y electrolíticas POR LITRO:

SUERO O SOLUCIÓN I.V	Na (mEq)	K (mEq)	Ca (mEq)	Mg (mEq)	Cl (mEq)	CO3H- (mEq)	Lac- (mEq)	Acetato (mEq)	Glu (g)	Osm (mOsm)	pH	Cal (Kcal)
Bicarbonato Na 1/6 M (1,4%)	167	-	-	-	-	167	-	-	-	333	-	-
Bicarbonato Na 1M (8,4%)	1000	-	-	-	-	1000	-	-	-	2000	7,0-8,5	-
Cloruro Sódico 0,45%	77	-	-	-	77	-	-	-	-	154	4,5-7	-
Cloruro sodico 3%	513,34	-	-	-	513,34	-	-	-	-	1.027	4,5-7	-
Cloruro sódico 0,9% (Suero fisiológico)	154	-	-	-	154	-	-	-	-	307	4,5-7	-
Glucosa 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	50	277	3,5-5,5	200
Glucosa 3,3%+ NaCl 0,3%	51,3	-	-	-	51,3	-	-	-	33	285	3,2-6,5	132
Glucosa 5% + NaCl 0,2%	34	-	-	-	34	-	-	-	50	320	4,5	182
Glucosa 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	555	4	400
Glucosa 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1100	4-4,5	800
Glucosa 30%	-	-	-	-	-	-	-	-	300	1655	4	1200
Glucosa 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2.777	3,5-5,5	2000
Ringer lactato	129,9	5,4	3,6	-	111,7	-	27,2	-	-	276	5-7	-

Anexo B2: COMPOSICIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES NORMALIZADAS

	PERIFERICA	SR (1)	I	II UVI	III	IV	IR (2)	IH (4)
Nitrógeno, g	10	7,7	10	10	13,5	13,5	6,5	9,7
Proteínas, g	63	50	63	63	85	85	40	60
Glucosa, g	150	150	200	200	200	250	200	200
Lípidos, g	80	50	50	75	90	100	75	50
Na (mEq)	85	85	85	85	85	80	-	85
K (mEq)	60	60	60	60	60	60	-	60
Ca (mEq)	15	15	15	15	15	10	-	15
Mg (mEq)	15	15	15	15	15	20	-	15
Cl (mEq)	126	119	126	126	90	116	-	90
Fosfatos (mM)	16	13,75	15	16	17	25	3,75	14
AcO (mEq)	75	75	75	75	165	97	-	110
Kcal NP/g N	139	140	135	154	123	148	238	132
Calorías totales	1600	1271	1575	1770	2000	2340	1710	1518
Cal no proteicas	1360	1078	1325	1516	1660	2000	1550	1278
Volumen, ml	2500	1600	1700	1990	2065	2596	1520	1700
Osmolaridad,	767	1090	1299	1104	1182	1071	1032	1271

mOsm/l								
Vitam./Oligoele.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	(3)	(5)

(1) SR: Síndrome de Realimentación (2): Insuficiencia renal. No contiene electrolitos, ajuste diario según necesidades. (3) Sólo vitaminas hidrosolubles (4): Insuficiencia Hepática. Electrolitos:ajuste diario según necesidades. Se recomienda suplementar Zn y Mg si se considera necesario (5) Valorar tiempo de protrombina para ajustar aporte de vit.K. se recomienda 1 amp. Vit K (10 mg)/semana

B05CB- Soluciones salinas para irrigación

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Sodio cloruro	Sol 0,9% 100 ml Sol 0,9% 500 ml Sol 0,9% 1000 ml vidrio Sol 0,9% 3000 ml	IRRIGACION IRRIGACION PEERF IV IRRIGACION	Suero fisiológico 0,9%

B05CX- Otras soluciones para irrigación

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Glicina	Sol 1,5% 3000 ml	IRRIGACIÓN	Glicina 1,5%

B05XA- Soluciones de electrolitos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Acetato potásico	Amp 1M 10ml (1 mEq K ⁺ , 1 mEq Acetato /ml)	PERF IV	Acetato potásico 1M
Acetato sódico	Amp 1M 10ml (1mEq Na ⁺ : + 1mEq Acetato /ml)	PERF IV	Acetato sódico 1M
Fosfato monosódico	Amp 1M 10ml (1mEq Fosfato + 1mEq Na ⁺ /ml)	PERF IV	Fosfato monosódico 1M
Fosfato monopotásico	Amp 1M 10ml (1mEq Fosfato + 1mEq K ⁺ /ml)	PERF IV	Fosfato monopotásico Medicamento de alto riesgo
Glicerofosfato monosódico	Vial 20 ml (1 mmol Fosfato + 2 mmol Sodio/ml)	PERF IV	Glycophos
Magnesio sulfato	Amp 15 % 10ml (1,2 mEq Mg ²⁺ /ml)	PERF IV	Sulfate de magnesio Medicamento de alto riesgo
Oligoelementos	Amp 10ml Vial 10ml	PERF IV PERF IV	Addamel (1)(3) Peditrace (2) (3) Medicamento extranjero
Potasio cloruro	Vial 2 M 20ml (2 mEq K ⁺ + 2 mEq Cl ⁻ /ml)	PERF IV	AP-inyect Vial de 20 ml contiene 40 mEq K ⁺ y 40 mEq Cl ⁻ Medicamento de alto riesgo
Sodio bicarbonato	Sol 1/6M (1,4%) 250ml vidrio Amp 1M 10ml (8,4%) Sol 1M (8,4%) 250 ml vidrio	PERF IV PERF IV PERF IV	Bicarbonato sódico 1/6M (1,4%) Bicarbonato Na 1M (8,4%) Venofusin
Sodio cloruro	Sol 3 g/100 ml 250 ml vidrio Amp 20% 10ml (3,42 mEq/ml)	PERF IV PERF IV	Cloruro sódico 3% Fórmula Magistral, Medicamento de alto riesgo Cloruro sódico 20%
Zinc sulfato	Amp 1mg Zn ²⁺ /ml 10ml	IV	Oligoelementos zinc

Nota 1: Contiene por 1ml (expresado en mcmol):0,02 Cr+2 Cu +2 Fe+ 0,5 Mn + 0,1 I +0,02 Mo+0,02 Se + 10 Zn + 5,12 Na + 0,1K

Nota 2: De uso en Pediatría. Contiene por 1ml (expresado en mcmoles): 3,82Zn+ 0,315 Cu+ 0,0182 Mn+0.0253 Se+ 3 F +0,00788 I

Nota 3: Uso exclusivo Nutrición parenteral

B05ZD- Hemofiltrados

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Bicarbonato+glucosa+electrolitos	Bolsa 5000 ml (4750 ml bicarbonato +250 ml glucosa y electrolitos)	HEMOFILTR	Multibic 3 mmol/l potasio

C - APARATO CARDIOVASCULAR

C01-TERAPIA CARDIACA

C01A-Glucósidos cardiotónicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Digoxina	Jbe 0,05mg/ml 60ml Comp 0,25mg Amp 0,5 mg/ml 2 ml	OR OR IV, PERF IV	La absorción de digoxina disminuye en presencia de antiácidos, colestiramina y otros fármacos. Amiodarona, quinidina, nifedipino y verapamilo incrementan el nivel plasmático de digoxina (reducir la dosis de digoxina en un 50%). Medicamento de alto riesgo. Ajustar en IR.

C01B-Antiarritmicos (Clases I y III)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Amiodarona	Comp 200mg Amp 50mg/ml 3ml	OR IV	Interacciones frecuentes con numerosos fármacos. Medicamento de alto riesgo
Fenitoína MP2	Vial 250mg/ml 5ml	IV, PERF IV	Administrar, antes y después de la fenitoína, una solución salina estéril a través del mismo catéter.
Flecainida	Comp 100mg Amp 10mg/ml 15ml	OR IV	Medicamento de alto riesgo El tratamiento oral en los pacientes con taquicardia ventricular sostenida debe iniciarse en el hospital por sus efectos pro-arrítmicos. Ajustar en IR. Se recomienda monitorizar a los pacientes con IR e IH severas
Procainamida	Vial 100mg/ml 10ml	IM, IV (caso urgencia)	Medicamento de alto riesgo Precaución en IR e IH.
Propafenona	Comp 150 mg Amp 3,5mg/ml 20ml	OR IV, PERF IV	Ajustar dosis en IR e IH Medicamento de alto riesgo
Vernakalant	Vial 20 mg/ml 25 ml	PERF IV	Medicamento de alto riesgo

C01C-Estimulantes cardiacos (exc.glucósidos cardiacos)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Dobutamina	Amp 12,5mg/ml 20ml	IV	Medicamento de alto riesgo
Dopamina	Amp 40mg/ml 5ml	IV	Medicamento de alto riesgo
Epinefrina (Adrenalina)	Amp 1mg/ml 1ml Jeringa precargada 1mg	IV, SC, IM, PERF IV IV, SC, IM, PERF IV	Medicamento de alto riesgo
Fenilefrina	Amp 10 ml	IV	Medicamento de alto riesgo
Isoprenalina	Amp 0,2mg/ml 1ml	IV, SC, IM, PERF IV	Aleudrina Nevera Medicamento de alto riesgo
Levosimendan	Vial 2,5 mg/ml	PERF IV	Medicamento de alto riesgo Medicamento de uso restringido Ajustar en IR.
Noradrenalina , (Norepinefrina bitartrato)	Amp 1mg/ml 10 ml	PERF IV	Medicamento de alto riesgo

C01D-Vasodilatadores usados en enfermedades cardiacas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Isosorbide mononitrato	Comp 20 mg Comp retard 40 mg	OR OR	No interrumpir tratamientos a largo plazo de forma brusca
Nitroglicerina	Comp 0.4 mg Amp 5mg/ml 10ml Parche 5mg Parche 10mg Parche 15mg	SL PERF IV TD TD TD	Precaución en IR e IH graves

C01E- Otros preparados para terapia cardíaca

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
-----------------	--------------	-----	---------------

Adenosina	Vial 3 mg/ml 2 ml	IV	Medicamento de alto riesgo Precaución en casos de asma, IR, IH, fibrilación auricular y flutter con vías alternativas.
Alprostadilo (Prostaglandina E1)	Amp 20 mcg/ 5 ml	IV	Contraindicado en IH. Precaución en IR. Nevera
Ibuprofeno	Amp 5 mg/ml 2 ml	IV	Uso restringido a neonatos
Ivabradina	Comp recub 5 mg Comp recub 7.5 mg	OR OR	Precaución en IR con Clcr < 15ml/min Medicamento con protocolo de uso
Ubidecarenona	Caps 50 mg	OR	Decorenone Disponibilidad por paciente. Medicamento extranjero. Para su dispensación es necesario cumplimentar informe de paciente y enviar a farmacia en formato electrónico
Trimetazidina	Comp 20mg	OR	Alerta de Agencia Española del medicamento https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/NI-MUH_FV_15-Trimetazidina.htm Ajustar dosis en IR

C02-ANTIHIPERTENSIVOS

(Ver también grupos C03 (Diuréticos), C07 (Betabloqueantes), C08 (Bloqueantes de los canales de calcio), C09 (Fármacos activos sobre sistema renina-angiotensina))

C02A- Antiadrenérgicos de acción central

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Clonidina	Comp 0,15 mg	OR	Ajustar dosis en IR
Metildopa	Comp 250mg Comp 500 mg	OR	Interfiere con pruebas de laboratorio (falsos positivos de catecolaminas urinarias). Ajustar en IR.

C02C- Antiadrenérgicos de acción periférica

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Doxazosina	Comp retard 4mg Comp 2 mg	OR	Precaución en IH
Fentolamina	Amp 10 mg/ml 1 ml	IV, IM	Medicamento extranjero. Para su dispensación es necesario cumplimentar informe
Urapidilo	Amp 5mg/ml 10ml	IV, PERF IV	Ajustar en IR. Precaución en IH e IR moderada-grave

C02D- Fármacos activos sobre el músculo liso arteriolar

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Hidralazina	Comp 50mg Amp 20mg/ml 1ml	OR IV, IM, PERF IV	En IR, ajustar dosis prolongando el intervalo de dosificación. Ajustar dosis en IH Se aconseja vigilar el cuadro hemático y realizar la determinación de anticuerpos antinucleares a intervalos de 6 meses aproximadamente (puede desarrollarse LES en tratamientos prolongados). Categoría C de la FDA (contraindicado en 1 ^{er} y 2 ^o trimestre de embarazo)
Nitroprusiato sódico	Vial 50mg	PERF IV	Medicamento de alto riesgo. Controlar los niveles de tiocianato (producto derivado del metabolismo del nitroprusiato), especialmente en pacientes con IR y/o IH. Si se sospecha intoxicación por cianuro, administrar tiosulfato sódico de forma urgente.

C02K- Otros antihipertensivos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Ambrisentan MP3	Comp 5 mg Comp 10 mg	OR OR	Medicamento Peligroso MP3 Exclusivo para pacientes con Hipertensión Pulmonar Arterial. Disponibilidad por paciente
Bosentan MP3	Comp 125mg	OR	Medicamento Peligroso MP3 Exclusivo para pacientes con Hipertensión Pulmonar Arterial. Disponibilidad por paciente

C03-DIURÉTICOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Amilorida + Hidroclorotiazida	Comp 5/50mg	OR	Ajustar en IR. Contraindicado en IR grave Precaución en IH
Clortalidona	Comp 50mg	OR	Ajustar en IR. Precaución en IH
Eplerenona	Comp 25 mg	OR	Ajustar en IR. Contraindicado en IR e IH graves
Espironolactona MP2	Comp 25mg Comp 100mg	OR OR	Medicamento Peligroso MP2 Ajustar en IR. Contraindicado en IR aguda
Furosemida	Comp 40mg Amp 10mg/ml 2ml Amp 10mg/ml 25ml	OR OR IV,IM PERF IV	Precaución en IR e IH
Hidroclorotiazida	Comp 50mg	OR	Contraindicado en IH e IR severa Clortalidona e hidroclorotiazida son equivalentes terapéuticos a dosis comparables.
Indapamida	Comp retard 1,5mg Comp 2.5 mg	OR OR	Ajustar en IR. Contraindicado en IH e IR graves
Torasemida	Comp 5 mg Comp 10 mg	OR OR	Sutril

C03-OTROS DIURÉTICOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Tolvaptán	Comp 15 mg Comp 30 mg	OR	Samsca Disponibilidad por paciente Medicamento con protocolo de uso

C04-VASODILADORES PERIFÉRICOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Pentoxifilina	Comp 400mg	OR	Ajustar dosis en IR e IH

Nota 1: Naftidrofuril (Praxilene), Vincamina (Tepavinca, Vincacen, Vincaminol), Gynko biloba (Tanakene), Nicergolina (Sermion, Varson), Clinadil y Diemil son medicamentos no incluidos en Guía y se consideran sin utilidad terapéutica en pacientes ingresados. La Comisión de Farmacia y Terapéutica recomienda suspender el tratamiento mientras el paciente permanezca ingresado.

C05-VASOPROTECTORES

C05A-Antihemorroidales tópicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Hidrocortisona + Neomicina + Benzocaina + Ác. Tánico	Pomada	REC	Antihemorroidal cinfa

C05B-Antivaricosos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Pentosanopolisulfúrico	Pda 0,1% (1mg/g) 60g	TOP	Thrombocid
Polidocanol	Amp 20mg/ml (2%) 2ml Amp (0.5%) 2 ml	Intravaricos a Intravaricos a	Etoxisclerol Medicamento extranjero de stock
Heparinoide	Gel 1% 40 g	TOP	Hirudoid
Dobesilato cálcico	Cap 500 mg	OR	Doxium Forte

C05B-Protectores capilares

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Hesperidina + Diosmina	Comp. 500 mg	OR	Daflon

C07-BETABLOQUEANTES ADRENÉRGICOS

C07A- Betabloqueantes adrenérgicos solos

C07AA- Betabloqueantes adrenérgicos no cardioselectivos solos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Propranolol	Comp 10mg Comp 40mg	OR OR	Precaución en IR e IH

C07AB-Betabloqueantes adrenérgicos cardioselectivos solos.

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Atenolol	Comp 50mg Amp 0,5mg/ml 10ml	OR IV, PERF IV	Cardioselectivo (la selectividad beta-1 se reduce a dosis altas) Ajustar dosis en IR Medicamento de alto riesgo
Bisoprolol	Comp 2,5mg Comp 5mg	OR	Emconcor Cor, Emconcor Ajustar en IR.
Esmolol	Bolsa 10mg/ml 250ml Amp 10 mg/ml 10 ml	PERF IV PERF IV	Medicamento de alto riesgo Precaución en IR
Metoprolol	Comp 100 mg	OR	Cardioselectivo Medicamento de alto riesgo
Nebivolol	Comp 5 mg	OR	Nebivolol EFG Contraindicado en IR

C07AG-Alfa y betabloqueantes adrenérgicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Carvedilol	Comp 6,25mg Comp 25mg	OR OR	Bloqueante alfa y beta Puede requerir ajuste de dosis en IH moderada
Labetalol	Comp 100 mg Amp 5mg/ml 20ml	OR IV, PERF IV	Si hay evidencia analítica de disfunción hepática deberá suspenderse el tratamiento. Medicamento de alto riesgo

C08- BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Amlodipino	Comp 5mg Comp 10mg	OR OR	Precaución en IH
Diltiazem	Comp 60mg Comp retard 120mg Caps 300 mg	OR OR OR	Puede potenciar la toxicidad de ciclosporina, digoxina y carbamazepina.
Manidipino	Comp 10 mg	OR	
Nifedipino	Cap 10 mg Comp retard 20mg Comp OROS 30mg	OR OR	Estrecho seguimiento en pacientes con IH
Nimodipino	Comp 30mg Vial 0.2mg/ml 50ml	OR PERF IV	Ajustar en IR. Precaución en IR grave Contraindicado en IH grave
Verapamilo	Comp 80 mg Comp 120 mg Comp 180 mg Comp 240 mg Amp 2,5mg/ml 2ml	OR OR OR OR IV LENTA	Ajustar dosis en IR e IH

C09- FÁRMACOS ACTIVOS SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

C09A- Inhibidores de la ECA

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Captoprilo	Comp 25mg Comp 50mg	OR OR	Ajustar en IR. Contraindicado en 2º y 3º trimestre de embarazo
Enalaprilo	Comp 5 mg Comp 20 mg	OR OR	Perindopril, lisinopril y fosinopril son alternativas terapéuticas equivalentes a dosis comparables. Ajustar en IR.
Ramiprilo	Comp 2,5 mg	OR	Ajuste de dosis en IR e IH

C09A- Asociaciones de IECA con diuréticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Enalapril + Hidroclorotiazida	Comp 20 + 12,5 mg	OR	Contraindicado en IR e IH graves

C09C- Antagonistas de la angiotensina II

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Irbesartan	Comp 150 mg	OR	Precaución en IR
	Comp 300 mg	OR	
Losartan	Comp 50mg	OR	Contraindicado en IR e IH graves
Valsartan	Comp 80 mg	OR	Contraindicado en IH grave
	Comp 160 mg	OR	

C09A- Antagonistas de angitensina con diuréticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Irbesartan + Hidroclorotiazida	Comp. 150 + 12,5 mg	OR	Contraindicado en IR e IH graves
	Comp 300 + 12,5 mg	OR	
Valsartan + Hidroclorotiazida	Comp 80 + 12,5 mg	OR	Contraindicado en IR e IH graves
	Comp. 160 + 12,5 mg	OR	
	Comp. 160 + 25 mg	OR	

C10-HIPOLIPEMIANTES

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Alirocumab	Pluma precar 75 mg	SC	<i>Praluent</i> Petición por paciente con protocolo de uso Nevera
Atorvastatina	Comp 20mg Comp 40 mg Comp 80 mg	OR	Precaución en IH Equivalente terapéutico de Rosuvastatina
Evolocumab	Pluma precar 140 mg	SC	<i>Repatha</i> Petición por paciente con protocolo de uso Nevera
Gemfibrozilo	Comp 900 mg Comp 600 mg	OR	Ajustar en IR. Contraindicado en IH e IR grave
Colestiramina	Sobres 4g	OR	<i>Resincolestiramina</i>
Simvastatina	Comp 20 mg Comp 40 mg	OR OR	<i>Pravastatina, Lovastatina, Fluvastatina y Pitavastatina son medicamentos no incluidos en la Guía y se consideran equivalentes terapéuticos de SIMVASTATINA.</i> Monitorizar las pruebas de función hepática y muscular antes y periódicamente durante el tratamiento. Contraindicado en embarazo. Vigilar estrechamente cuando se administra con fibratos, eritromicina, ciclosporina y niacina por aumento del riesgo de miositis.

D-TERAPIA DERMATOLÓGICA

D01-ANTIFÚNGICOS DERMATOLÓGICOS

D01AC- ANTIFÚNGICOS TÓPICOS: DERIVADOS IMIDAZÓLICOS Y TRIAZÓLICOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Clotrimazol	Crema 1% 30g	TOP	Canesten

D02- EMOLIENTES Y PROTECTORES

D02AB-EMOLIENTES Y PROTECTORES: PRODUCTOS CON ZINC

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Zinc óxido (Pasta Lassar)	Pda 50 g	TOP	Amniolina bálsamo

D02AC-EMOLIENTES Y PROTECTORES: PREPARADOS DE VASELINA Y PRODUCTOS GRASOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Aceite de almendras dulces	Fco 125ml	TOP	Aceite de almendras dulces
Lanolina ultrapurificada	Sobre 1,5 g	TOP	Purelan
Vaselina	Pda 30g	TOP	Vaselina KERN

D03-PREPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE ULCERAS Y HERIDAS

D03AX-OTROS CICATRIZANTES

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Centella asiática +Neomicina	Pda 30g	TOP	1 g contiene: 10mg extracto de centella asiática + 3,5mg neomicina
Calciferol, Bálsamo Perú, Estrona, Tirotricina, Benzocaína, Retinol	Pda 50g	TOP	Cicatral

D03BA-ENZIMAS PROTEOLÍTICOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Clostridiopeptidasa +Proteasa	Pda 15 g	TOP	1g contiene: 1,2 UI clostridiopeptidasa + 0,24 UI proteasa

D06-ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERÁPICOS PARA USO DERMATOLÓGICO

D06AX-Otros antibióticos tópicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Ácido fusídico	Crema 2% 15g	TOP	Fucidine tópico
Gentamicina	Crema 0,1% 15g	TOP	Gevramycin tópico
Mupirocina	Pda 2% 30g Pda 2% 3g nasal	TOP TOP	Bactroban Bactroban Nasal

D06BA - Quimioterápicos tópicos: SULFONAMIDAS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Sulfadiazina argéntica	Crema 1% 50g	TOP	Silverderma

D06BB - Quimioterápicos tópicos: ANTIVIRALES

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Aciclovir	Crema 5% 15g	TOP	

D07-PREPARADOS DERMATOLÓGICOS CON CORTICOSTEROIDES

D07A-CORTICOSTEROIDES TÓPICOS SOLOS

D07AA- Corticosteroides de baja potencia (grupo I)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Hidrocortisona	Pda 0.5% 30g	TOP	Calmiox

D07AC- Corticosteroides potentes (grupo III)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Betametasona	Crema 0,05% 30g	TOP	Celestoderm V 0.05%, Celecrem
Mometasona	Crema 0,1% 30g	TOP	Elocom, Mometasona EFG
Prednicarbato	Pda 0,25% 30g	TOP	Peitel

D07C- CORTICOSTEROIDES TÓPICOS EN COMBINACIÓN CON ANTIBIÓTICOS

D07CC- Corticosteroides potentes en combinación con antibióticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Betametasona+Gentamicina	Crema 30g	TOP	<i>Celestoderm Gentamicina</i>

D08-ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES

D08AC: DERIVADOS DE BIGUANIDAS Y AMIDINAS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Clorhexidina	Sol acuosa 2% monodosis 10 ml Sol acuosa 2% Spray 250 ml Sol acuosa 0,5 % Frasco 250 ml Sol alcohólica 2% 250ml sol coloreada Sol alcohólica 2% 250ml sol transparente	TOP	<i>Disponible Guía de utilización de antisépticos elaborada por Comisión de Infecciones Junio 2016 en Intranet</i> http://intranet.hnsp.sescam.jclm.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20de%20utilizaci%C3%B3n%20de%20antis%C3%A9pticos2016.pdf
Alcohol etílico 70º+ Clorhexidina	Sol 250ml	TOP	<i>Alcohol 70º -Composición por 100 ml:95.5ml alcohol 70º y clorhexidina 0.5ml</i>

D08AG: DERIVADOS DE YODO

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Povidona yodada acuosa	Gel 10% 30g Sol 10% monodosis Sol 10 % 500ml, 125 ml Sol jabonosa 7,5% 500ml	TOP TOP TOP TOP	<i>Betadine gel</i> <i>Curadona</i> <i>Betadine solución dérmica</i> <i>Betadine lavado quirúrgico</i> <i>Disponible Guía de utilización de antisépticos elaborada por Comisión de Infecciones Junio 2016 en Intranet</i> http://intranet.hnsp.sescam.jclm.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20de%20utilizaci%C3%B3n%20de%20antis%C3%A9pticos2016.pdf

D08AJ: COMPUESTOS AMONIO CUATERNARIO

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Alcohol etílico 70º+ Cetilpiridinio	Sol (0,05% cetilp) 1000ml	TOP	<i>Alcohol 70º- Composición por 100 ml: 99.9 ml de alcohol etílico 70º y 0.1 g cetilpiridinio cloruro</i>

D08AK: COMPUESTOS DE MERCURIO

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Mercurbromina	Sol 2% 250ml	TOP	<i>Mercromina</i>

D08AL: COMPUESTOS DE PLATA

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Nitrato de Plata	Varillas 50mg	TOP	<i>Argenpal</i>

D08AX: OTROS ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Agua oxigenada (Peróxido de hidrógeno)	Fco 10 Volúmenes 250 ml	TOP	<i>Agua oxigenada</i>

D09A-APÓSITOS MEDICAMENTOSOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Bálsamo Perú + Aceite de ricino	Apósito 5.5x 8 cm	TOP	<i>Linitul</i>
Copolimero acrílico+Acetato de etilo + Disulfuro de tetrametilouramio (Apósito plástico en aerosol)	Aerosol 275g 250ml	TOP	<i>Nobecután</i>

G-TERAPIA GENITOURINARIA (INCL.HORMONAS SEXUALES)

G01-ANTIINFECIOSOS Y ANTISÉPTICOS GINECOLÓGICOS

G01A-Antiinfeciosos y antisépticos ginecológicos, excluyendo combinaciones con corticosteroides

G01AF- Derivados imidazólicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Metronidazol	Comp vag 500mg	VAG	<i>Esta terapéutica debe ir asociada siempre con la administración de metronidazol por vía oral.</i>
Clotrimazol	Comp vag 100mg	VAG	

G02-OTROS PRODUCTOS GINECOLÓGICOS

G02A-Oxitócicos

G02AB-Alcaloides del ergot

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Metilergometrina maleato	Amp 0,2mg/ml 1ml	IM,IV	<i>Precaución en IR, IH e HTA Su acción se potencia con simpaticomiméticos y macrólidos.</i>

G02AD-Prostaglandinas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Carboprost trometanol	Amp 250mcg/ml	IM	<i>Hemabate Medicamento extranjero Nevera</i>
Dinoprostona MP3	Disp vag 10mg	VAG	<i>Medicamento peligroso MP3 Conservar en congelador. Precaución en IR.</i>
Misoprostol MP3	Comp 200mcg	OR	<i>Medicamento peligroso MP3 Protocolo fuera de FT. Contraindicado en IR grave</i>

G02B-Anticonceptivos locales

G02BA-Anticonceptivos intrauterinos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Levonorgestrel SIL (1)	DIU 52mg (14mcg/24h)	Intrauterina	<i>Mirena</i>

Nota 1: Levonorgestrel SIL (Sistema Intrauterino Liberador de Levonorgestrel):

Condiciones de uso en Hospital Ntra Sra del Prado

Indicación aprobada en el Hospital Ntra Sra del Prado:

-Alternativa a la ablación endometrial o histerectomía en mujeres con menorragia idiopática que no responde a otros tratamientos médicos.

- Su prescripción y uso se realizará por especialistas de obstetricia y ginecología para **pacientes adscritos al hospital.**

-Se requiere un impreso de solicitud por paciente para dispensación y **administración en el hospital.**

G02C-Otros productos ginecológicos

G02CA-Simpaticomiméticos, Inhibidores del parto

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Ritodrina	Amp 10mg/ml 5ml	IV	<p>Alerta seguridad AEMPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> El uso de ritodrina de administración parenteral debe limitarse a un máximo de 48 horas y administrarse bajo supervisión de un especialista en las indicaciones autorizadas en obstetricia: <ul style="list-style-type: none"> Prevención del parto prematuro entre las 22 y 37 semanas de gestación En caso de urgencia en condiciones específicas. El uso de ritodrina se puede asociar a reacciones cardiovasculares graves, en ocasiones mortales, en la madre y el feto / recién nacido. Ritodrina de administración parenteral no debe usarse en mujeres con antecedentes de enfermedad cardíaca o en condiciones en las que la prolongación del embarazo sea peligrosa para la madre o el

			feto.
--	--	--	-------

G02CB-Inhibidores de prolactina

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Cabergolina MP3	Comp 0,5 mg	OR OR	Medicamento Peligroso MP3 Contraindicado en IH grave

G02CX-Otros productos ginecológicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Atosiban	Vial 7,5mg/ml 0,9ml (6,75 mg) Vial 7,5 mg/ml 5ml (37,5 mg)	IV IV	Tractocile Nevera Medicamento de especial control

G03-HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL

G03D- Progestágenos

G03DA-Derivados del pregneno

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Progesterona (natural) MP2	Cáps. 100mg	OR	Medicamento Peligroso MP2 Progeffik Este medicamento contiene aceite de cacahuete. No debe utilizarse en caso de alergia al cacahuete o a la soja

G03G-Gonadotrofinas y otros estimulantes de la ovulación

G03GA-Gonadotrofinas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Coriogonadotropina α (Gonadotropina coriónica α) MP3	Jer. prec 250mcg/0,5ml	SC	Medicamento Peligroso MP3 Ovitrelle Nevera
Folitropina α (FSH α)	Jer prec 300 UI/0,36ml	IM,SC	Puregon Nevera
Folitropina α + Lutropina α	Vial 150/75 UI + vial	SC	Pergoveris
Urofolitropina	Vial 150 UI/ml + amp	SC	Fostipur

G04-PRODUCTOS DE USO UROLÓGICO

G04B-Otros productos de uso urológico, incluyendo antiespasmódicos

G04BD-Antiespasmódicos urinarios

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Oxibutinina	Comp 5mg	OR	Precaución en IR e IH Contraindicado en glaucoma de ángulo estrecho, miastenia gravis y atonía intestinal.

G04BE-Fármacos usados en disfunción eréctil (USO EXCLUSIVO EN HOSPITAL PARA HIPERTENSIÓN PULMONAR)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Sildenafil	Comp recub. 20mg Comp recub. 25mg Comp recub. 50mg	OR	Revatio Sildenafil EFG Ajustar en IR. Disponibilidad por paciente
Tadalafilo	Comp recub. 20mg	OR	Adcirca Ajustar en IR. Disponibilidad por paciente

G04C-Fármacos utilizados en hipertrofia prostática benigna (1)

G04CA-Antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Tamsulosina	Caps 0,4mg	OR	Contraindicado en IH grave

G04CB-Inhibidores de la testosterona 5-alfa reductasa

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Finasterida MP3	Comp recub. 5mg	OR	Medicamento Peligroso MP3

Nota 1: Extractos vegetales para la hipertrofia benigna de próstata (Acubiron, Bidrolar, Neo Urogenin, Pronitol, Prosturool, Sereprostat, Spasmo urgenin, Tebetane compuesto, Tuzanil, Urogenin gotas Permixon) son medicamentos no incluidos en la Guía y se consideran sin utilidad terapéutica en pacientes ingresados. La Comisión de Farmacia y Terapéutica recomienda suspender el tratamiento mientras el paciente permanece ingresado.

Nota 2: Duodart (Tamsulosina/dutasterida) no está incluido en la GFT del hospital, y la combinación Tamsulosina+ Finasterida se considera equivalente terapéutico incluido.

H-TERAPIA HORMONAL

H01-HORMONAS HIPOTALÁMICAS E HIPOFISIARIAS

H01A-Hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis

H01AA-ACTH

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Tetracosáctido hexacetato	Amp 0,25mg/ml	IV,IM	<i>Cosyntropin/Synacthen según disponibilidad</i> <i>Nevera</i> <i>Medicamento extranjero</i>

H01AC-Somatropina y agonistas de somatropina

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Somatropina (Hormona somatotropa = Hormona del crecimiento = STH)	0.2 mg 0.4 mg 0.6 mg 0.8 mg 2 mg	SC	<i>Genotonorm</i> <i>Saizen</i> <i>Variar los puntos de inyección para evitar lipoatrofia.</i>

H01BA-Vasopresina y análogos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Desmopresina	Amp 4mcg/ml 1ml	OR IV, IM, SC	<i>Prestar atención especial al riesgo de retención hídrica. Restringir al máximo la ingesta de líquidos y controlar el peso corporal regularmente</i>
Terlipresina	Vial 1mg/5ml	IV	<i>Precaución en IR crónica</i>

H01BB-Oxitocina y análogos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Oxitocina MP3	Amp 10 UI/ml 1ml	IV	<i>Medicamento peligroso MP3</i> <i>Medicamento de alto riesgo</i>

H01C-Hormonas hipotalámicas

H01CA-Hormonas liberadoras de gonadotropinas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Gonadorelina	Amp 100mcg/ml 1ml	IV, IM, SC	<i>LHRH Ferring</i> <i>Nevera</i> <i>Medicamento extranjero. Para su dispensación es necesario cumplimentar informe de paciente y enviar a farmacia en formato electrónico</i>

H01CB-Inhibidores de la hormona del crecimiento

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Octreótido	Amp 100mcg/ 1ml Vial 30 mg (LAR)	IV,SC	<i>Ajuste de dosis de mantenimiento en IH</i> <i>Se recomienda realizar exámenes de la vesícula biliar cada 6-12 meses, debido al riesgo de formación de cálculos biliares en tratamientos prolongados.</i>
Somatostatina	Amp 0,25mg Amp 3mg	IV	<i>Controlar la glucemia a intervalos regulares durante el tratamiento (bloquea la liberación de glucagón e insulina)</i> <i>Ajustar en IR.</i>

H01CC-Inhibidores de las hormonas liberadoras de gonadotropina

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Cetrorelix MP3	Vial 0,25mg	SC	<i>Medicamento peligroso MP3</i> <i>Cetrotide</i>

Ganirelix MP3	Jer. Prec.0,25mg	SC	<i>Contraindicado en IR grave. Medicamento Peligroso MP3 Orgalutran Contraindicado en IR grave</i>
----------------------	------------------	----	--

H02-CORTICOSTEROIDES SISTÉMICOS

H02A-Corticoides sistémicos, solos

H02AA-Corticoides sistémicos, solos: Mineralocorticoides

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Fludrocortisona	Comp 0,1mg	OR	

H02AB- Corticoides sistémicos, solos: Glucocorticoides

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Betametasona fosfato + Betametasona acetato	Vial 3/3mg / ml 2ml	IM Intrarticular	
Deflazacort	Comp 30 mg Comp 6 mg	OR OR	
Dexametasona	Comp 1mg Amp 4mg/ml 1ml	OR IV, IM, OR	
Hidrocortisona	Comp 20mg Vial 100mg Vial 500mg	OR IV,IM	<i>Precaución en IR.</i>
Metilprednisolona	Comp 4mg Comp 40mg Amp 8mg Amp 20mg Vial 40mg Vial 125mg Vial 250mg Vial 500mg Vial 1g	OR OR IV,IM IV,IM IV,IM IV,IM IV IV IV	
Prednisolona	Gts 13.3 mg/ml 10ml	OR	
Prednisona	Comp 10mg Comp 50mg Comp 5mg Comp 30mg	OR OR OR OR	
Triamcinolona acetónido	Amp 40mg/ml 1ml	IM, Intrarticular	

H03-TERAPIA TIROIDEA

H03A- Preparados tiroideos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Levotiroxina (T4=Tiroxina)	Comp 50mcg Comp 100mcg Vial 500mcg	OR OR IV	

H03B- Preparados antitiroideos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Tiamazol MP2	Comp 5mg	OR	<i>Medicamento peligroso MP2</i>

H04- HORMONAS PANCRÉATICAS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Glucagón	Vial 1mg/ml + jer 1ml	SC,IM	<i>No se debe administrar mediante perfusión intravenosa</i>

H05- HOMEOSTASIS DEL CALCIO

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Cinacalcet	Comp 30mg Comp 60mg	OR OR	
Calcitonina	Vial 100 UI	SC, IM	

GRUPO J-TERAPIA ANTIINFECCIOSA, USO SISTÉMICO

J01-ANTIBACTERIANOS USO SISTÉMICO

J01A-Tetraciclinas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Doxiciclina	Caps 100mg Amp 20mg/ml 5ml	OR IV, PERF IV	Precaución en IH No administrar las caps. con antiácidos (espaciar 1h antes o 2h después). No recomendado su uso en menores de 8 años ni embarazadas.
Tigeciclina	Vial 50mg	PERF IV	Antibiótico restringido aprobado para tratamiento dirigido de infecciones intraabdominales o piel y partes blandas según datos de antibiograma por patógenos resistentes. Se requiere impreso específico para su dispensación.

J01C-Betalactamas, penicilinas

J01CA-Penicilinas de amplio espectro

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Amoxicilina	Susp 250mg/5ml 120ml Sobres 250mg Sobres 500mg	OR OR OR OR	Ajustar dosis en IR
Amoxicilina+ác. clavulánico	Susp 100/12,5mg/ml 40ml Sobres 250/62.5mg Sobres 500/125mg Comp 500mg Sobres 875/125mg Vial 500/50mg Vial 1g/200mg Vial 2g/200mg	OR OR OR OR OR OR OR IV, PERF IV IV, PERF IV	Ajustar dosis en IR
Ampicilina	Vial 500mg Vial 1g	IM, IV, PERF IV IV IM, IV, PERF IV	Ajustar dosis en IR

J01CE-Penicilinas sensibles a betalactamasas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Penicilina G (Bencilpenicilina) benzatina	Vial 2.400.000 UI	IM	Benzetacil
Penicilina G (Bencilpenicilina) sódica	Vial 1.000.000 UI Vial 5.000.000 UI	PERF IV, IM PERF IV, IM	Penibiot Ajustar en IR.

J01CF-Penicilinas resistentes a betalactamasas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Cloxacilina	Jbe 25mg/ml 60ml Caps 500mg Vial 1g Vial 500mg	OR OR IM, IV PERF IV IM, IV PERF IV	Administración oral en ayunas Vía IV puede producir flebitis por lo que se recomienda diluir y perfundir en no menos de 30min.

J01CR-Penicilinas amplio espectro

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Piperacilina-Tazobactam	Vial 4g+500mg	IV, PERF IV	Ajustar dosis en IR

J01D-Betalactamas, otros

J01DB-Cefalosporinas de 1ª generación

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Cefazolina	Vial 1g Vial 2g	IM, IV, PERF IV IM, IV, PERF IV	Ajustar en IR.

J01DC-Cefalosporinas de 2ª generación

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Cefoxitina	Vial 1g	IV, PERF IV	Ajustar en IR.
Cefuroxima	Vial 750mg	IM, IV PERF IV	Ajustar en IR.
Cefuroxima axetilo	Susp 250mg/5 ml 60ml Comp 500mg Sobres 250 mg Sobres 500 mg	OR OR	Ajustar dosis en IR

J01DD-Cefalosporinas de 3ª generación

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Cefditoreno	Comp 400mg	OR	No debe administrarse a pacientes alérgicos a las proteínas de la leche (contiene caseinato sódico) Ajustar en IR.
Cefixima	Suspensión 100mg/5ml	OR	
Cefotaxima	Vial 500mg Vial 1g Vial 2g	IV, PERF IV IV, PERF IV IV, PERF IV	Ajustar en IR.
Ceftazidima	Vial 1g Vial 2g	IM(1),IV PERF IV IV, PERF IV	Ajustar en IR. (1): Reconstituir con 3ml de lidocaina 1% Incompatible en la misma solución con vancomicina y aminoglucósidos.
Ceftriaxona	Vial 1g Vial 1 g Vial 2g	IM IV, PERF IV IV, PERF IV	Incompatible en la misma solución con vancomicina

J01DE- Cefalosporinas 4ª generación

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Cefepime	Vial 1g Vial 2g	IV, IM IV	Ajustar en IR.

J01DF-Monobactamas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Aztreonam	Vial 1g Vial 75mg + amp para nebuliz	IM,IV PERF IV AEROSOL	No es compatible con metronidazol o vancomicina en la misma solución. Puede prolongar el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial. Ajustar dosis en IR. Evitar la administración de dosis altas y durante períodos prolongados en IH. Presentación en aerosol-Disponibilidad por paciente

J01DH- Carbapenems

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Ertapenem	Vial 1 g	PERF IV	Tratamiento dirigido en infecciones por bacterias BLEE sensibles por antibiograma Sólo para tratamientos en Hospital de Día Médico. Ajustar en IR.
Imipenem-Cilastatina	Vial 500/500mg	PERF IV	Ajustar dosis en IR
Meropenem	Vial 1g Vial 500mg	IV, PERF IV IV, PERF IV	Ajustar dosis en IR

J01DI-Otras cefalosporinas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Ceftazidima/Avibactam	Vial 2/0,5 g	PERF IV	Antibiótico restringido aprobado para el tratamiento de Pacientes de UCI con infecciones muy graves producidas por cepas resistentes a carbapenems (carbapenemasas de clase A, ej. tipo KPC) y betalactamasas clase D de Ambler (OXA-carbapenemasas, incluyendo OXA-48) cuando no exista

			una alternativa terapéutica. En pautas de tratamiento empírico, la indicación ha de limitarse a situaciones excepcionales de cuadro infeccioso grave en pacientes colonizados por <i>Klebsiella</i> productora de KPC o OXA-48. Ajustar dosis en IR.
Ceftolozano/Tazobactam	Vial 1/ 0,5 g	PERF IV	Antibiótico restringido aprobado para Tratamiento empírico de Pacientes de UCI con infección por Bacilos gran negativos (<i>Enterobacterias</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> u otros) con criterios de gravedad, alta sospecha de multiresistencia o que exista fracaso o intolerancia al tratamiento de primera línea.. Tratamiento dirigido: Paciente hospitalizado con infección documentada por antibiograma de bacilo gram negativo ultrirresistente. Ajustar dosis en IR.

J01E- Sulfamidas y Trimetoprim

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + Trimetoprim)	Comp 800/160mg Comp 400/80mg Vial 800/160mg	OR OR IM,PERF IV	Ajustar en IR. El vial contiene el sulfametoxazol y la ampolla el disolvente y el trimetoprim. No utilizar otro disolvente.
Sulfadiazina	Comp 500mg	OR	Sulfadiazina

J01F-Macrólidos, lincosamidas y estreptograminas

J01FA-Macrólidos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Azitromicina	Sobres 250 mg Comp 500mg Susp 200mg/5ml 30 ml	OR OR OR	La administración con comida o con antiácidos que contengan Mg o Al disminuyen la absorción
Claritromicina	Susp 25mg/ml 100ml Comp 500mg Vial 500mg	OR OR PERF IV	La administración con comida aumenta la absorción. Ajustar en IR.
Eritromicina	Tab 500mg Vial 1g	OR IV	Ajustar en IR.

J01FF- Lincosamidas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Clindamicina	Caps 150mg Caps 300mg Amp 600mg	OR IM,PERF IV	Las asociaciones con cloranfenicol y macrólidos pueden ser antagonicas

J01G-Aminoglucósidos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Amikacina	Vial 250mg/ml 2 ml	IM, PERF	Ajustar dosis en IR Para la administración IV diluir 0.5g en 100 ml de SF o SG5%
Gentamicina	Vial 40mg 2ml Vial 80mg 2ml Vial 240mg 3ml	IM,PERF IV IM,PERF IV IM,PERF IV	Ajustar dosis en IR
Tobramicina	Vial 50mg/ml 2ml Amp 75mg/ml 4 ml	IM,PERF IV INH	Ajustar dosis en IR Para la administración IV diluir en 50-100 mL de SF, SG5% o SGS Tobramicina inhalada- Disponibilidad por paciente

J01M-Quinolonas antibacterianas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Ciprofloxacino	Sol 2mg/ml 100ml Sol 2mg/ml 200ml Comp 250mg Comp 500mg Comp 750mg	PERF IV PERF IV OR OR OR	400 mg iv equivalen a 750 mg vía oral. Los cationes divalentes y trivalentes (Ca y Mg, Fe y Zn) disminuyen su absorción. Ajustar dosis en IR. Se recomienda valorar el paso a vía oral lo antes posible.
Levofloxacino	Comp 500mg	OR	Ajustar dosis en IR

	Vial 5mg/ml 100ml	IV	<i>Se recomienda valorar el paso a vía oral lo antes posible.</i>
Moxifloxacino	Comp 400mg	OR	
Norfloxacina	Comp 400mg	OR	

J01X-Otros antibacterianos

J01XA-Otros antibacterianos: glucopeptidos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Teicoplanina	Vial 200mg Vial 400mg	IM, IV PERF IV IM, IV PERF IV	<i>Incompatible en la misma solución con aminoglucósidos y con ciprofloxacino. Ajustar dosis en IR</i>
Vancomicina	Vial 500mg Vial 1000mg	PERF IV, OR (1) PERF IV	<i>Ajustar dosis en IR. La heparina puede inactivarla. (1)En infecciones por Clostridium difficile puede administrarse el contenido del vial por vía oral.</i>

J01XB- Otros antibacterianos: polimixinas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Colistimetato de sodio	Vial 1 MUI Vial 2 MUI	PERF IV, INH	<i>Antibiótico de uso restringido por la Comisión de Infecciones: se requiere impreso específico para su dispensación Ajustar en IR.</i>

J01XD- Otros antibacterianos: imidazoles

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Metronidazol	Comp 250mg Susp oral 125 mg/ 5 ml Sol 5mg/ml 100ml Sol 5mg/ml 300ml	OR OR IV,PERF IV PERF IV	<i>Produce efecto antabús. Ajustar dosis en IR e IH severa.</i>

J01XX- Otros antibacterianos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Fosfomicina	Vial 1 g Vial 1 g	Perf iv Perf iv	<i>Antibiótico guiado por antibiograma Ajustar en IR.</i>
Fosfomicina trometamol	Sob 3g Caps 500mg	OR OR	
Daptomicina	Vial 350mg Vial 500mg	PERF IV PERF IV	<i>Antibiótico de uso restringido por la Comisión de Infecciones: se requiere impreso específico para su dispensación Ajustar en IR.</i>
Linezolid	Comp 600mg Sol 2mg/ml 300ml Susp 100mg/5ml 150ml	OR PERF IV OR	<i>Antibiótico de uso restringido por la Comisión de Infecciones: se requiere impreso específico para su dispensación</i>

J02-ANTIMICÓTICOS, USO SISTÉMICOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Anfotericina B liposomal	Vial 50mg/15ml	PERF IV	<i>Mezcla IV preparada en el Servicio de Farmacia. Antifúngico de uso restringido por la Comisión de Infecciones: se requiere impreso específico para su dispensación.</i>
Anidulafungina	Vial 100 mg	PERF IV	<i>Antifúngico de uso restringido por la Comisión de Infecciones: se requiere impreso específico para su dispensación</i>
Caspofungina	Vial 50mg Vial 70mg	PERF IV PERF IV	<i>Antifúngico de uso restringido por la Comisión de Infecciones: se requiere impreso específico para su dispensación</i>

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Fluconazol MP3	Susp 10mg/ml 35ml Caps 50mg Caps 100 mg Bolsa 2mg/ml 50ml Bolsa 2mg/ml 100ml	OR OR OR PERF IV PERF IV	Medicamento peligroso MP3 Ajustar dosis en IR. Existen interacciones con anticoagulantes, antidepresivos tricíclicos, antidiabéticos orales, tracolimus, antihistamínicos, cisaprida, fenitoina, hidroclorotiazida, hipolipemiantes, rifampicina, isoniazida y teofilina entre otros fármacos.
Isavuconazol	Caps 100 mg Sol perf 200 mg	PERF IV	Antifúngico de uso restringido por la Comisión de Infecciones para el tratamiento intravenoso de la aspergilosis invasiva en pacientes adultos con: -Insuficiencia renal moderada-severa (aclaramiento de creatinina < 50 ml/min), - Cirrosis hepática leve a moderada (Child Pugh A y B) e -Intolerancia a voriconazol.
Posaconazol	Comp gastror 100 mg Vial 300 mg	OR PERF IV	Antifúngico de uso restringido por la Comisión de Infecciones: se requiere impreso específico para su dispensación Alerta Agencia Española del medicamento https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/NI-MUH_FV_13-posaconazol.htm
Voriconazol MP3	Comp 200mg Susp 40mg/ml Vial 200mg	OR OR PERF IV	Medicamento peligroso MP3 Interacciona con fármacos que se metabolizan por isoenzimas del citocromo P450. Ajustar en IR. Suspensión-Disponibilidad por paciente

J04-ANTIMICOBACTERIANOS

J04A-Antituberculosos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Etambutol	Gg 400mg	OR	Ajustar en IR.
Isoniacida	Amp 60mg/ml 5ml	IM,IV	
Isoniacida + Piridoxina (B6)	Comp 150mg/25mg	OR	
Isoniazida + Pirazinamida + Rifampicina	Comp 50/300/120mg	OR	
Isoniazida + Pirazinamida +Rifampicina + Etambutol	Comp recub 75/400/150/275mg	OR	Contraindicado en IR grave. Usar con precaución en IR moderada e IH, y en pacientes con alteraciones visuales.
Pirazinamida	Comp 250 mg	OR	Ajustar en IR severa Evitar en IH
Rifampicina	Susp 20mg/ml 120ml Caps 300mg Vial 600mg	OR OR PERF IV	Ajustar en IR. Contraindicado en enfermedad hepática activa e IR grave

J05-ANTIVIRALES, USO SISTÉMICO

J05AB-Antivirales: nucleósidos y nucleótidos, excluidos Inhibidores de la transcriptasa Inversa

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Aciclovir	Susp 80mg/ml 200ml Comp 200mg Comp 800mg Vial 250mg	OR OR OR PERF IV	Precaución en embarazo. Ajustar dosis en IR Potencia la acción del metotrexato y aumenta el efecto de meperidina. Con zidovudina puede producir somnolencia y letargo intensos. Aciclovir y valaciclovir son equivalentes terapéuticos a dosis comparables.
Ganciclovir MP2	Vial 500mg	PERF IV	Medicamento peligroso MP2 Preparado en el área de citostáticos del Servicio de Farmacia. Ajustar dosis en IR.

J05AE-Antivirales: Inhibidores de la proteasa

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Boceprevir	Cap duras 200 mg	OR	Petición por paciente según protocolo aprobado en CFyT

Darunavir	Comp 600mg Comp 800mg	OR OR	<i>Debe tomarse con alimentos (aumenta la biodisponibilidad)</i>
Ritonavir	Comp recubiertos 100mg Susp 80mg/ml 90ml	OR OR	<i>Interacciones con diversos medicamentos a nivel del citocromo P450. Disminuir dosis en IH moderada. Se recomienda monitorizar los parámetros anticoagulantes cuando se administra con warfarina.</i>
Saquinavir	Comp 500mg	OR	<i>Interacciones con diversos medicamentos a nivel del citocromo P450. Precaución en IH y trastornos de la coagulación.</i>
Telaprevir	Comp recub 375 mg	OR	<i>Petición por paciente según protocolo aprobado en CFyT</i>
Lopinavir+Ritonavir	Comp 200/50mg Comp recub 100/25mg	OR OR	

J05AF-Nucleósidos y nucleótidos Inhibidores de la transcriptasa Inversa

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Abacavir + Lamivudina MP2	Comp 600/300mg	OR	<i>Medicamento peligroso MP2 Ajustar en IR.</i>
Adefovir	Comp 10mg	OR	<i>Puede ser aconsejable administrar un suplemento diario de L-carnitina Ajustar en IR.</i>
Emtricitabina	Caps 200mg	OR	<i>Ajustar en IR.</i>
Emtricitabina + Tenofovir	Comp 200/245mg	OR	<i>245mg de Tenofovir equivalen a 300mg de Tenofovir disopropil fumarato. Ajustar en IR.</i>
Entecavir MP2	Comp 1mg Comp 0.5mg	OR OR	<i>Medicamento peligroso MP2 Debe administrarse con el estómago vacío (2h antes o 2h después de la ingesta, especialmente si ésta es grasa) Ajustar dosis en IR</i>
Lamivudina (3TC)	Comp 100mg Comp 300mg	OR OR	<i>Ajustar dosis en IR</i>
Tenofovir	Comp 245mg	OR	<i>245mg de Tenofovir equivalen a 300mg de Tenofovir disopropil fumarato. Ajustar en IR.</i>
Zidovudina (AZT) MP2	Sol 10mg/ml 200ml Caps 250mg Vial 10mg/ml 20ml	OR OR PERF IV	<i>Medicamento peligroso MP2 Ajustar dosis en IR grave</i>

J05AG-No nucleósidos Inhibidores de la transcriptasa Inversa

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Efavirenz	Comp 600mg	OR	
Etravirina	Comp 200 mg	OR	
Nevirapina MP2	Comp 200mg	OR	<i>Medicamento peligroso MP2 Interacciones con diversos medicamentos a nivel del citocromo P450. Ajustar en IR.</i>
Rilpivirina	Comp recub 25 mg		

J05AR-Combinaciones de antivirales para tratamiento infección VIH

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida fumarato	Comp recub 50/200/25 mg	OR	<i>No iniciar tratamiento si CLCr estimado < 30ml/min y suspender si CLCr < 30 ml/min. Disponibilidad por paciente según protocolo uso</i>
Dolutegravir + Lamivudina	Comp recub 50/300 mg	OR	<i>No iniciar tratamiento si CLCr estimado < 30ml/min y suspender si CLCr < 30 ml/min. Disponibilidad por paciente según protocolo uso</i>
Elvitegravir + cobicistat + emtricitabina + tenofovir	Comp recub 150/150/200/245 mg	OR	

Emtricitabina + Rilpivirina + Tenofovir	Comp recub 200/25/245 mg	OR	Ajustar en IR.
Emtricitabina +Tenofovir alafenamida fumarato	Comp recub 200/25 mg Comp. recub 200/10 mg	OR	No iniciar tratamiento si CLCr estimado < 30ml/min y suspender si si CICr < 30 ml/min

J05AX- Otros antivirales

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Dolutegravir	Comp recub 50 mg	OR	
Elbasvir + Grazoprevir	Comp recub 50/100 mg	OR	
Sofosbuvir + Velpatasvir	comp. recub 400/100 mg	OR	No se ha evaluado en IR Grave

J06-SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Inmunoglobulina anti-hepatitis B	Amp 200 UI/ml 5ml	IM	Igantibe anti-Hbs
Inmunoglobulina anti-rábica	Vial 150 UI/ml 2ml	IM,Infiltrac	Imogam rabia Nevera
Inmunoglobulina anti-Rh	Jer prec 750 UI/ml 2ml (150mcg/ml)	IM	Gamma anti-D (Igamad) Nevera
Inmunoglobulina anti-tetánica	Jer prec 500 U/ml 2ml	IM	Gamma antitetanos Nevera
Inmunoglobulina humana inespecífica intravenosa	Vial 10g	IV	Flebogamma Nevera
Inmunoglobulina humana inespecífica subcutánea	Vial 1g 5ml Vial 2g 10ml Vial 4g 20ml	SC	Hizentra Nevera Medicamento restringido Disponibilidad por paciente
Inmunoglobulina humana antivariçela	Vial 125UI/5ml Vial 1250UI/50ml	PERF IV	Varitect Medicamento extranjero Nevera
Palivizumab	Vial 50mg Vial 100mg	IM IM	Synagis Nevera Disponibilidad por paciente

J07-VACUNAS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Toxoide tetánico + Toxoide diftérico (2)	Jer prec 40/4 UI 0,5ml	IM, SC	Ditebooster jer prec 0,5 ml Nevera
Vacuna anti-fiebre amarilla	Jer prec 0.5ml	IM, SC	Stamaril Pasteur Nevera Disponibilidad para el Centro de vacunación Internacional del Hospital Ntra. Sra. del Prado
Vacuna anti-haemophilus influenzae tipo b	Vial 10mcg	IM	Hiberix Nevera
Vacuna anti-hepatitis B	Jer prec 20mcg/ml 1ml 40mcg vial 1ml	IM IM	Engerix B-20 Fendrix Nevera
Vacuna anti-encefalitis japonesa	Jer prec	IM	Ixiaro Nevera Disponibilidad para el Centro de vacunación Internacional del Hospital Ntra. Sra. del Prado
Vacuna anti-meningococo tipo B	Jer prec	IM	Bexsero Nevera
Vacuna anti-meningococo tipos A,C,Y y W	Amp 0.5ml	SC profunda	Menveo Nevera Disponibilidad para el Centro de vacunación Internacional del Hospital Ntra. Sra. del Prado
Vacuna anti-neumocócica conjugada	Jer prec 0,5ml	IM	Prevenar 13 Nevera
Vacuna anti-rábica	Vial 2,5 UI	IM	Rabipur Nevera Medicamento restringido
Vacuna contra el virus del papioma	Jer prec 0,5ml	IM	Gardasil 9

humano (VPH)		<i>Nevera</i> <i>Disponibilidad por paciente segun</i> <i>Protocolo terapéutico de vacunación</i> <i>frente al VPH aprobado en CFyT</i>
--------------	--	--

L-TERAPIA ANTINEOPLÁSICA Y AGENTES INMUNOMODULADORES

L01-CITOSTÁTICOS

Medicamentos de alto riesgo (citos parenterales y orales).

L01A-Agentes alquilantes Medicamentos peligrosos Grupo 1 MP1

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Bendamustina	Vial 2,5 mg/ml 25 mg Vial 2,5 mg/ml 100 mg	IV	
Carmustina	Vial 100mg	IV	Nevera
Ciclofosfamida	Comp 50mg Vial 1g Vial 200 mg	OR PERF IV PERF IV	
Clorambucilo	Comp 2 mg	OR	
Dacarbazina	Vial 1g	PERF IV	
Ifosfamida	Vial 1g	PERF IV	
Melfalan	Comp 2 mg Vial 50mg	OR PERF IV	
Temozolamida	Caps 5mg Caps 20mg Caps 100mg Caps 140 mg Caps 140 mg	OR OR OR OR OR	

L01B-Antimetabolitos Medicamentos peligrosos Grupo 1 MP1

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Azaciditidina	Vial 100mg (25mg/ml)	SC	Disponibilidad por paciente
Capecitabina	Comp recub 150 mg Comp recub 500 mg	OR	
Citarabina (Ara-C)	Vial 500mg	SC, IM, IV, PERF IV	
Decitabina	Vial 50 mg	PERF IV	Disponibilidad por paciente
Fludarabina	Vial 50mg	PERF IV	
Fluorouracilo (5FU)	Vial 50mg/ml 5ml Vial 50mg/ml 100ml	IV, PERF IV IV, PERF IV	
Gemcitabina	Vial 2g	PERF IV	Nevera
Metotrexato (Ametopterina)	Comp 2,5mg Vial 25mg/ml 2 ml Vial 25mg/ml 40ml	OR IV, IM PERF IV	
Pemetrexed	Vial 500mg Vial 100 mg	PERF IV PERF IV	
Raltitrexed	Vial 2 mg	PERF IV	
Tioguanina	Comp 40 mg	OR	

L01C-Alcaloides de plantas y otros productos naturales Medicamentos peligrosos Grupo 1 MP1

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Cabazitaxel	Vial + disolvente 60 mg	PERF IV	Disponibilidad por paciente según protocolo uso servicio de oncología
Docetaxel	Vial 10 mg/ml 2 ml Vial 10 mg/ml 8 ml	PERF IV PERF IV	
Etopósido (VP-16)	Vial 20mg/ml 5ml Caps 50 mg	PERF IV OR	
Paclitaxel	Vial 6mg/ml 17ml (100 MG)	PERF IV	
Paclitaxel nanoalbúmina	Vial 100 mg	PERF IV	Disponibilidad por paciente según protocolo uso servicio de oncología
Vinblastina	Vial 1mg/ml 10ml	PERF IV	Nevera
Vincristina	Vial 1mg/ml 1 ml	PERF IV	Nevera
Vinorelbina	Caps 20mg Caps 30mg Vial 10mg/ml 5ml	OR OR PERF IV	Nevera

L01D-Antibióticos citotóxicos y sustancias relacionadas

Medicamentos peligrosos Grupo 1 MP1

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Bleomicina	Vial 15mg	IV,IM,SC, Intrapleural , PERF IV	1mg=1 UI Nevera
Daunorubicina	Vial 20 mg	PERF IV	
Doxorrubicina (Adriamicina)	Vial 2 mg/ml 25ml	PERF IV	Nevera
Doxorrubicina liposomal pegilada	Vial 2mg/ml 10 ml	PERF IV	Nevera
Idarrubicina	Vial 5mg Vial 10mg	PERF IV PERF IV	
Mitomicina	Vial 40 mg	PERF IV, Intravesical	
Mitoxantrona	Vial 2mg/ml 10ml	PERF IV	

L01X-Otros citostáticos

L01XA- Otros citostáticos: Derivados del platino

Medicamentos peligrosos Grupo 1 MP1

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Carboplatino	Vial 10 mg/ml 5 ml Vial 10 mg/ml 15 ml Vial 10mg/ml 45ml	PERF IV	
Cisplatino	Vial 1mg/ml 100ml	PERF IV	
Oxaliplatino	Vial 5mg/ml 10ml Vial 5mg/ml 20ml	IV IV	

L01XC- Otros citostáticos: Anticuerpos monoclonales

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Bevacizumab biosimilar	Vial 25mg/ml 4 ml Vial 25mg/ml 16ml	PERF IV	Nevera
Cetuximab	Vial 5mg/ml 20ml	PERF IV	Nevera
Nivolumab MP1	Vial 40 mg 4 ml Vial 100 mg 10 ml	PERF IV	Medicamento peligroso MP1 Nevera Disponibilidad por paciente según protocolo uso
Pembrolizumab MP 1	Vial 50 mg Vial 100 mg 4 ml	PERF IV	Medicamento peligroso MP1 Nevera Disponibilidad por paciente según protocolo uso
Rituximab biosimilar	Vial 10mg/ml 10ml Vial 10mg/ml 50ml	PERF IV	Nevera
Trastuzumab MP1	Vial 600 mg	SC	Nevera
Trastuzumab biosimilar MP1	Vial 150mg (21mg/ml)	PERF IV	Nevera

L01XE-Inhibidores directos de la protein-quinasa (Disponibilidad por paciente)

Medicamentos peligrosos Grupo 1 MP1

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Dasatinib	Comp 20mg Comp 50mg Comp 70mg	OR OR OR	
Erlotinib	Comp 100mg Comp 150mg	OR	
Gefitinib	Comp recub 250 mg	OR	
Lapatinib	Comp recub 250 mg	OR	
Nilotinib	Caps 150 mg Caps 200 mg	OR	
Pazopanib	Comp recub 400 mg	OR	Protocolo de uso
Sunitinib	Caps 12,5mg Caps 25mg Caps 50mg	OR OR OR	
Sorafenib	Comp 200mg	OR	

L01XX-Otros citostáticos

Medicamentos peligrosos Grupo 1 MP1 Y MP3

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Bexaroteno MP1	Caps 75 mg	OR	
Bortezomib MP1	Vial 3,5mg	IV	Nevera
Hidroxiurea (Hidroxycarbamida) MP1	Caps 500mg	OR	
Imatinib mesilato MP1	Comp 100mg Comp 400mg	OR	Alerta Agencia Española del medicamento https://www.aemps.gob.es/informa/notas_informativas/medicamentosUsoHumano/s eguridad/2016/NI-MUH_FV_08-hepatitis-B.htm
Irinotecan MP1	Vial 20mg/ml 5ml Vial 40 mg 2 ml	PERF IV PERF IV	
Topotecán MP1	Vial 4mg (1mg/ml)	PERF IV	
Tretinoína MP3	Caps 10 mg	OR	

L02-TERAPIA ENDOCRINA Medicamentos peligrosos MP1

L02AB-Hormonas y derivados: Progestágenos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Megestrol acetato MP1	Sobre 160mg Susp 200mg/5 ml 240 ml	OR	

L02AE-Análogos de hormonas liberadoras gonadotropinas (Tratamiento reproducción asistida)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Triptorelina MP1	Vial 0,1mg/ml 1 ml Vial 3,75 mg + amp 2 ml	SC IM	

L02BA-Antiestrógenos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Tamoxifeno MP1	Comp 10mg	OR	

L02BB-Antiandrógenos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Bicalutamida MP1	Comp 50mg	OR	
Enzalutamida MP1	Cap 40 mg	OR	Disponibilidad por paciente según protocolo uso servicio de oncología

L02BX- Otros Antagonistas de hormonas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Abiraterona MP1	comp. 250 mg	OR	Disponibilidad por paciente según protocolo uso servicio de oncología

L03-INMUNOESTIMULANTES

L03AA-Estimulantes de colonias

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Filgrastim biosimilar	Jer 300mcg/0,5ml Jer 480mcg/0,5ml	SC	Nevera
Pegfilgrastim biosimilar	Jer 6mg/0.6ml	SC	Nevera Disponibilidad por paciente

L03AB-Interferones (Disponibilidad por paciente)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Interferón alfa 2 b	Vial 10 MUI/ml 1 ml	PERF IV	Nevera
Interferón alfa 2 a pegilado (Peginterferón alfa 2 a)	Jer 135mcg Jer 180mcg	SC SC	Nevera
Interferón alfa 2 b pegilado (Peginterferón alfa 2 b)	Pluma prec 50mcg Pluma prec 80mcg Pluma prec 100mcg Pluma prec 120mcg Pluma prec 150mcg	SC SC SC SC SC	Nevera

Interferón beta 1-a	Pluma prec 30mcg Jer prec 22mcg Jer prec 44mcg	IM SC SC	Nevera Alerta Agencia Española del Medicamento https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_12-2014-interferones.htm
Interferón beta 1-a pegilado (Peginterferon beta 1-a)	Pluma prec 63mcg + Pluma prec 94 mcg Pluma prec 125 mcg	SC SC	Nevera
Interferón beta 1-b	Vial 0,25mg (8 MUI)/ml	SC	Nevera

L03AX-Otras citoquinas e inmunomoduladores.

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Glatiramer, acetato de	Jer prec 20mg/ml 1ml	SC	Nevera Disponibilidad por paciente
Bacilos atenuados Mycobacterium bovis MP1	Vial 12,5 mg	Intravesical	Medicamento peligroso MP1 Nevera

L04-INMUNOSUPRESORES

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Abatacept	Vial 250mg+1 jer sol perf Jer 125 mg Pluma 125 mg	IV SC SC	Disponibilidad por paciente Nevera
Adalimumab biosimilar	Jer prec 40mg/0,8ml Pluma prec 40mg	SC SC	Nevera Disponibilidad por paciente
Alemtuzumab	Vial 12 mg 1,2 ml	PERF IV	Disponibilidad por paciente Nevera
Apremilast	Comp recub 10/20/30 mg Caja de inicio Comp recub 30mg	OR	Disponibilidad por paciente según protocolo
Azatioprina MP2	Comp 50mg	OR	Medicamento peligroso MP2 Disponibilidad por paciente
Baricitinib	Comp 4 mg	OR	Disponibilidad por paciente según protocolo uso en Artritis Reumatoide
Brodalumab	Jer prec 210 mg 0,5 ml	SC	Nevera Disponibilidad por paciente según protocolo
Certolizumab pegol	Jer prec 200 mg 1 ml	SC	Nevera Disponibilidad por paciente
Ciclosporina A MP2	Caps 25mg Caps 50mg Caps 100mg Amp 50mg/ml 1ml	OR OR OR IV	Medicamento peligroso MP2
Cladribina MP1	10 mg comp	OR	Medicamento peligroso MP1 Disponibilidad por paciente
Etanercept biosimilar	Jer prec 25mg Jer prec 50mg	SC SC	Disponibilidad por paciente Nevera
Fingolimod MP2	Cap duras 0,5 mg	OR	Medicamento peligroso MP2 Disponibilidad por paciente. Alerta de Agencia Española del Medicamento https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2015/NI-MUH_FV_12-fingolimod-gilenya.htm
Golimumab	Pluma 50 mg 0,5 ml	SC	Nevera Disponibilidad por paciente.
Infliximab biosimilar	Vial 5mg/ml 20ml	PERF IV	Nevera Disponibilidad por paciente
Ixekizumab	Jer prec 80 mg 1 ml	SC	Nevera Disponibilidad por paciente según protocolo
Leflunomida MP2	Comp recub 10 mg	OR	Medicamento peligroso MP2 Contraindicado en pacientes con IR moderada a grave Contraindicado en pacientes con IH

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Lenalidomida MP2	Caps 5mg Caps 10mg Caps 15mg Caps 25mg	OR OR OR OR	Medicamento peligroso MP2 Disponibilidad por paciente.
Micofenolato mofetilo MP2	Caps 250mg Comp 500mg	OR OR	Medicamento peligroso MP2 Alerta de Agencia Española del Medicamento https://www.aemps.gob.es/informa/notas_informativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2015/NI-MUH_FV_09-Micofenolato_y_micofenolato_sodico.htm
Micofenolato de sodio MP2	Comp gastroresist 180mg Comp gastroresist 360mg	OR OR	Medicamento peligroso MP2 Alerta de Agencia Española del Medicamento https://www.aemps.gob.es/informa/notas_informativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2015/NI-MUH_FV_09-Micofenolato_y_micofenolato_sodico.htm
Natalizumab	Vial 300mg	IV	Disponibilidad por paciente Nevera Alerta Agencia Española del medicamento https://www.aemps.gob.es/informa/notas_informativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/NI-MUH_FV_01-natalizumab-tysabri.htm
Ocrelizumab	Vial 300 mg	Perf iv	Disponibilidad por paciente Nevera
Sarilumab	Pluma 200 mg	SC	Disponibilidad por paciente segun protocolo uso en Artritis Reumatoide
Secukinumab	150 mg pluma prec	SC	Disponibilidad por paciente Nevera
Tacrolimus MP2	Caps y caps lib prolongada 0,5 mg Caps 1mg	OR OR OR	Medicamento peligroso MP2
Talidomida MP2	Caps 50mg	OR	Medicamento peligroso MP2 Medicamento de especial control médico. Medicamento extranjero. Para su obtención es necesario cumplimentar informe de paciente en formato electrónico y conformidad del laboratorio.
Teriflunomida MP3	Comp. recub 14 mg	OR	Medicamento peligroso MP3 Disponibilidad por paciente
Tocilizumab	Vial 80 mg Vial 200mg Jer pret 162 mg	PERF IV PERF IV SC	Disponibilidad por paciente. Nevera
Tofacitinib	Comp 5 mg	OR	Disponibilidad por paciente segun protocolo uso en Artritis Reumatoide
Ustekinumab	Jer prec 45 mg	SC	Disponibilidad por paciente nevera

M-SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO

M01-ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS (1)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Dexketoprofeno	Amp 25mg/2ml	IV, PERFIV	Duración máxima de tratamiento IV 2 días. Sólo se incluye en la guía la presentación IV debido a la existencia de otras alternativas menos gastrolesivas por vía oral (ibuprofeno). Ajustar en IR. Contraindicado en IR grave.
Diclofenaco	Sup 100mg Amp 25mg/ml 3ml	REC IM, IV	No asociar con otros AINE, corticosteroides, anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios ya que aumenta el riesgo de gastroenteropatía. Alerta AEMPS: restricciones de uso por riesgo cardiovascular Contraindicado en IR grave.
Ibuprofeno	Susp 20mg/ml 200ml Comp 400mg Comp 600mg Soluc perfusión 6mg/ ml 100 ml	OR OR OR' PERF IV	Alerta Agencia Española del Medicamento https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2015/NI-MUH_FV_04-ibuprofeno-dexibuprofeno.htm Ajustar en IR. Duración máxima de tratamiento IV no debe superar los 3 días. Uso exclusivo Urgencias con Protocolo de uso
Indometacina	Comp 25 mg Sup 100 mg	OR REC	No asociar con otros AINE, corticosteroides, anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios ya que aumenta el riesgo de gastroenteropatía Ajustar en IR.
Ketorolaco	Comp 10 mg Amp 30 mg	OR IM, IV, PERF IV	Duración máxima de tratamiento IV no debe superar los 2 días. En el caso de ketorolaco VO, la duración no debe superar los 7 días. Contraindicado en IR grave.

Nota 1: Otros medicamentos del grupo de los AINEs como por ejemplo: Ketoprofeno (Arcental, Fastum, Ketosolan, Orudis), Naproxeno (Aleve, Aliviomas, Antalgin, Denaxpren, Lundiran, Momen, Naprosyn, Naproval, Tacron), Aceclofenaco (Airtal, Falcol, Gerbin, Sanein), Flurbiprofeno (Froben), Nabumetona (Listran, Relief), Tenoxicam (Reutenox), y Tolmetin (Artrocaptin) son medicamentos no incluidos en la Guía y se consideran equivalentes terapéuticos de los AINEs incluidos.

M02-PREPARADOS TÓPICOS PARA DOLORES MUSCULARES Y ARTICULARES

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Diclofenaco	Gel 1% (10mg/g) 60g	TOP	Voltaren emulgel

M03-MIORRELAJANTES

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Atracurio besilato	Amp 10mg/ml 2,5ml Amp 10mg/ml 5ml	IV, PERF IV IV, PERF IV	Medicamento de alto riesgo. Monitorizar la función neuromuscular para individualizar la dosificación Nevera
Baclofeno	Comp 10mg Comp 25mg	OR OR	Potencia la acción de depresores del SNC. Tomar con comidas Precaución en IR
Cisatracurio	Amp 2mg/ml 2,5ml Amp 2mg/ml 5ml	IV, PERF IV IV, PERF IV	Medicamento de alto riesgo. Precaución en IR Nevera
Dantroleno	Vial 20mg/60ml	PERF IV	Medicamento extranjero. Solicitud por paciente. Evitar uso conjunto con calcioantagonistas, especialmente verapamilo (riesgo de hiperpotasemia y colapso cardiovascular)
Rocuronio bromuro	Vial 10mg/ml 5ml	IV, PERF IV	Medicamento de alto riesgo Nevera Ajuste en IR
Suxametonio	Amp 50mg/ml 2ml	IV, PERF IV IV, PERF IV	Medicamento de alto riesgo. Disminuir dosis en IH e IR

			Nevera
Tizanidina	Comp 4 mg	OR	Reducir dosis en IR
Toxina botulínica	Vial 100 UI / 6,5ml Vial 500 UI / 3ml Vial 100 UI/ml	SC, IM SC,IM	Botox Dysport Xeomin (Sólo Neurología) Medicamento de alto riesgo. Nevera

M04-ANTIGOTOSOS.

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Alopurinol	Comp 100mg Comp 300mg	OR OR	Aportar suficiente liquido y mantener la orina neutral o ligeramente alcalina Ajustar en IR
Colchicina MP3	1 mg granulos	OR	Medicamento peligroso MP3 Estrecho margen terapéutico. Precaución en ancianos y en pacientes con cardiopatía y hepatopatía. Disminuir dosis en IR. Contraindicado en IR grave
Colchicina +Diclocloverina MP3	Comp 0,5mg+5mg	OR	Medicamento peligroso MP3

M05-PREPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ÓSEAS

M05BA- Bifosfonatos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Alendronato	Comp 70 mg	OR	Monitorizar calcemia periódicamente. Contraindicado en IR grave
Zoledronato MP3	Solc. Inyectable 4mg/100ml	PERF IV	Medicamento peligroso MP3 Se prepara en el Servicio de Farmacia. Monitorizar Ca, K, fosfato, Mg y función renal. Hidratar antes y después de la administración. Realizar hemograma periódico Ajustar a IR

M05BX- Otros fármacos que afectan la estructura ósea y la mineralización

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Denosumab	Vial 120 mg /1,7 ml	SC	Con protocolo de uso Nevera Alerta de Agencia Española del Medicamento https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_13-2014-Denosumab.htm

- GRUPO N- SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

N01-ANESTESICOS

N01AB-Anestésicos generales: hidrocarburos halogenados

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
-----------------	--------------	-----	---------------

Desflurano	Fco 100% 240ml	INH	Medicamento de alto riesgo
Sevoflurano	Fco 100% 250ml	INH	Medicamento de alto riesgo

N01AF- Anestésicos generales: barbitúricos, solos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Tiopental sódico	Vial 0,5 g	IV, PERF IV	Requiere vale de psicótropo para dispensación Medicamento de alto riesgo

N01AH- Anestésicos generales: anestésicos opioides

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Fentanilo	Amp 0,15 mg/ 3ml	IV,IM, PERF IV	Medicamento de alto riesgo. Estupefaciente. Ajustar dosis en IR e IH
Remifentanilo	Vial 2mg/5ml Vial 5mg/10ml	IV, PERF IV	Medicamento de alto riesgo. Estupefaciente

N01AX-Otros anestésicos generales

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Etomidato	Amp 2mg/ml 10ml (20mg)	IV LENTA, PERF IV	Reducir dosis en IH. Precaución en pacientes con porfiria. Inhibe la síntesis de corticosteroides. Medicamento de alto riesgo
Ketamina	Vial 50mg/ml 10ml (500 mg)	IM,IV, PERF IV	Valorar premedicación anticolinérgica para disminuir sialorrea. Medicamento de alto riesgo
Oxido nitroso + oxígeno	Bala 5 l	GAS DE INHALACION	Medicamento de alto riesgo
Propofol	Amp 10mg/ml (1%) 20ml (200 mg) Vial 10mg/ml (1%) 100ml (1000 mg) Vial 20mg/ml (2%) 50ml (1000 mg)	IV, PERF IV	Medicamento de alto riesgo

N01B-Anestésicos locales

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Bupivacaína	Amp 2,5mg/ml (0,25%)10ml Amp 5mg/ml (0,5%)10ml Amp 7,5mg/ml (0,75%) 10ml	-- -- --	Precaución en IH e IR Es el anestésico local más cardiotoxic
Bupivacaína hiperbárica	Amp 5mg/ml 4ml (20 mg)	--	
Bupivacaína + Epinefrina (1)	Amp 0,25%10 ml (2) Amp 0,5%10ml (3)	--	Inibsacaín Plus (2) Contiene por 1ml= 25mg bupivacaína+ 50mcg epinefrina (3) Contiene por 1ml=50mg bupivaciana+ 50mcg epinefrina
Etilo, cloruro	Aerosol 100% 100 g	TOP	Cloretilo Chemirosa
Levobupivacaína	Bolsa 1,25 mg/ml 100 ml Bolsa 1,25 mg/ml 200 ml	-- --	Chirocane Precaución en IR y/o IH
Lidocaína	Aerosol 10% (100mg/ml) 50ml Gel 2% (209mg/ml) 10 ml (4) Amp 20mg/ml (2%)10ml (200 mg) Amp 50mg/ml (5%) 10ml (500 mg)	TOP TOP -- --	Xilonibsa aerosol Instillagel Lidocaína Precaución en IH e IR. (4) 1 ml de gel contiene: 209mg de hidrocloreuro de lidocaína+ 27,8mg de clorhexidina digluconato 20%
Lidocaína hiperbárica	Amp 50mg/ml (5%) 2ml (100 mg)	--	
Mepivacaína	Amp 10mg/ml (1%) 10ml (100 mg) Amp 20mg/ml (2%) 2 ml (40 mg) Amp 20mg/ml (2%) 10ml (200 mg)	-- --	Mepivacaína , Scandinibsa Precaución en IH
Prilocaína + Lidocaína	Pda 25mg/g+ 25mg/g (Tubo 30g)	TOP	Emla 1g de crema contiene: 25mg prilocaína+25mg lidocaína
Ropivacaína	Amp 2 mg/ml 10 ml (20 mg) Amp 7,5 mg/ml 10 ml (75 mg) Bolsa 2 mg/ml 100 ml (200 mg)	--	Naropin , Naropin Polibag. Ajustar osis en IR e IH
Tetracaína	Pda 0.75% (7,5mg/g) 25g Vial 10mg/ml 20 ml (200 mg)	TOP ---	Lubricante urológico Organon. Anestesia Tópica Braun S/A

Tetracaína + Epinefrina (1)	Vial 10/ 0,1mg /ml 20 ml (200/2 mg)	--	Tetracaína 1% C/A FM
-----------------------------	--------------------------------------	----	----------------------

Nota 1: Epinefrina = Adrenalina

N02-ANALGÉSICOS

N02A-Opioides

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Buprenorfina	Parche 20mg (35mcg/h) Parche 30mg (52,5mcg/h) Parche 40mg (70mcg/h)	TRANSDERMICA	Medicamento de alto riesgo. Disminuir dosis en IH. Estupefaciente
Fentanilo	Parche 12mcg/h Parche 25mcg/h Parche 50mcg/h Parche 75mcg/h Parche 100mcg/h Comp chupar 200mcg Comp chupar 400mcg Comp bucales 100 mcg Comp bucales 200 mcg	TRANSDERMICA Transmuc Bucal	Medicamento de alto riesgo. Los parches no se pueden dividir ni cortar. Estupefaciente Ajustar en IR.
Morfina	Comp 10mg Comp 20mg Comp 5mg retard Comp 10mg retard Comp 30mg retard Comp 60mg retard Comp 100mg retard Amp 10mg/ml 1ml Amp 20mg/ml 2 ml. Vial 20mg/ml 20ml	OR OR SC, IV, IM, PERF IV, SC, IV, IM, PERF IV, IV, PERF IV	Medicamento de alto riesgo. Ajustar dosis en IR. Evitar en IH. Estupefaciente
Oxicodona	Caps 5 mg Caps 10 mg Comp 10mg retard Comp 40mg retard Amp 10 mg/ ml 1 ml Amp 20 mg	OR OR SC, IV, PERF IV, PERF SC	Medicamento de alto riesgo. No asociar a IMAO (ni hasta 15 días después de su interrupción). Estupefaciente Ajustar en IR.
Petidina (Meperidina)	Amp 50mg/ml 2ml (100 mg)	SC, IM, IV	Medicamento de alto riesgo. La administración por vía IM es irritante. Estupefaciente Ajustar en IR.
Tramadol + paracetamol	Comp recub 37,5 / 325mg	OR	Medicamento de alto riesgo Ajustar en IR.
Tramadol	Caps 50mg Amp 50mg/ml 2ml (100 mg)	OR SC, IM, IV, PERF IV	Medicamento de alto riesgo. Alargar intervalo entre dosis en IR. Puede aumentar el INR en uso conjunto con anticoagulantes orales

N02B-Otros analgésicos y antipiréticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	Com	OBSERVACIONES
Ác. acetilsalicílico	Comp 500mg Vial 180mg/ml 5ml	OR IV, IM, PERF IV	Tomar preferentemente después de las comidas (OR). Ajustar en IR. Precaución en ancianos, IR, IH, embarazo, asma bronquial y antecedentes de úlcera péptica
Metamizol (Dipirona) (Noramidopirina)	Caps 575mg Sup 500mg Amp 400mg/ml 5ml	OR REC IV, IM, OR	Precaución en IH e IR. Ampollas bebibles
Paracetamol	Gts 100mg/ml 30ml Comp 650 mg Comp 1g Sup 150mg lactantes Sup 300 mg infantil Sup 600 mg adultos Bolsa 10mg/ml 100ml	OR REC PERF IV	Aumentar intervalo de dosificación en IR. Evitar dosis > 2g/día en IH

Tetrahidrocannabinol + Cannabidiol (Nabiximoles)	Soluc pulv bucal 10 ml	BUCAL	Medicamento con protocolo de uso Nevera Estupefaciente
--	------------------------	-------	---

N02C-Antimigrañosos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Erenumab	Pluma prec 70 mg Pluma prec 140 mg	SC	Nevera Disponibilidad por paciente. Protocolo de uso aprobado en CyFT (06/21). Cumplimentar "Documento de Solicitud de Inicio, Continuación o Cambio con anti-CGRP para la Migraña".
Fremanezumab	Jer prec 225 mg	SC	Nevera Disponibilidad por paciente. Protocolo de uso aprobado en CyFT (06/21). Cumplimentar "Documento de Solicitud de Inicio, Continuación o Cambio con anti-CGRP para la Migraña".
Galcanezumab	Pluma prec 120 mg	SC	Nevera Disponibilidad por paciente. Protocolo de uso aprobado en CyFT (06/21). Cumplimentar "Documento de Solicitud de Inicio, Continuación o Cambio con anti-CGRP para la Migraña".
Sumatriptan	Jer autoiny 6mg/0,5ml	SC	Contraindicado en HT Monitorizar estrechamente en pacientes con IR e IH

N03-ANTIEPILEPTICOS

N03AA-Antiepilepticos barbitúricos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Fenobarbital	Comp 15mg Comp 100mg Amp 200mg/ml 1ml	OR OR IM	Ajustar dosis en IH e IR Psicotropo

N03AB-Antiepilepticos: hidantoínas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Fenitoína sódica MP2	Caps 100mg	OR	Medicamento peligroso MP2 Monitorizar concentraciones plasmáticas (farmacocinética no lineal) Ajustar dosis en IH

N03AE-Antiepilepticos: benzodiazepinas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Clonazepam MP3	Gts 2,5mg/ml 10ml Comp 0,5mg Comp 2mg Amp 1mg/ml 1ml	OR OR OR IM*, IV	Medicamento peligroso MP3. Psicotropo 1 gota=0,1mg +Vía IM Excepcionalmente

N03AF-Antiepilepticos: carboxamidas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Carbamazepina MP2	Comp 200mg Comp 400 mg	OR	Medicamento peligroso MP2 Ajustar dosis en IR. Precaución en IH
Oxcarbamazepina MP2	Comp 300mg Comp 600mg	OR	Medicamento peligroso MP2 Ajustar dosis en IR. Precaución en IH severa. Monitorizar sodio en pacientes con riesgo de hiponatremia (en tto.con diuréticos, desmopresina, AINE...)

N03AG-Antiepilepticos: ácidos grasos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Valproico ác. MP3	Sol 200mg/ml 60ml Comp 500mg Comp 300mg crono Comp 500mg crono Vial 400mg	OR OR IV, PERF IV	Medicamento peligroso MP3 Monitorizar función hepática y realizar recuentos sanguíneos periódicamente. Contraindicado en IH. Valorar ajuste de dosis en IR Alerta Agencia Española del Medicamento

			https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_16-valproato.htm
Valpromida	Comp 300mg	OR	Depamide Ajustar en IR.

N03AX-Otros antiepilépticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Gabapentina	Cáps 100mg Cáps 300mg Cáps 400mg	OR	Rango de dosis eficaz 300- 3600 mg/día repartidos en 3 dosis. Ajustar dosis en IR. En caso de suspensión del fármaco, realizarla gradualmente
Lamotrigina	Comp 25mg Comp 50mg	OR	Reducir dosis en IR e IH. En caso de suspensión del fármaco, realizarla gradualmente
Pregabalina	Caps 25mg Caps 75mg Caps 150 mg	OR	Reducir dosis en IR. Puede requerir ajuste de la medicación hipoglucemiante
Topiramato MP3	Comp 25mg Comp 100mg	OR	Medicamento peligroso MP3 Precaución en IR e IH. En caso de suspensión del fármaco, realizarla gradualmente
Levetiracetam	Sol 100 mg/ml 300 ml Comp recub 250 mg Comp recub 500 mg Comp recub 1000 mg Vial 100 mg/ml 5 ml	OR PERF IV	Ajustar dosis en IR. Retirar de forma gradual
Lacosamida	Vial 200 mg 20 ml Comp 50 mg	PERF IV OR	Protocolo de uso CFyT Ajustar en IR.

N04-ANTIPARKINSONIANOS

N04A-Antiparkinsonianos: anticolinérgicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Biperideno	Comp 2mg Comp retard 4mg Amp 5mg/ml 1ml	OR OR IM, IV	Anticolinérgico débil, pero aditivo con Levodopa. Mejora el temblor, pero no la rigidez ni la bradiquinesia. La retirada del fármaco debe ser lenta y progresiva

N04B-Antiparkinsonianos: dopaminérgicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Levodopa + Benserazida	Comp 200/50mg	OR	No suspender el tratamiento bruscamente
Levodopa + Carbidopa	Comp 250/25mg Comp 100/25mg Comp retard 200/50mg Comp retard 100/25mg	OR OR OR OR	No suspender el tratamiento bruscamente
Levodopa + Carbidopa + Entacopona	Comp 50/12,5/200 mg Comp 75/18.75/200 mg Comp 100/25/200 mg Comp 125/31.25/200 mg Comp 150/37,5/200 mg Comp 200/50/200 mg	OR	No suspender el tratamiento bruscamente Precaución en IR
Pramipexol	Comp 0,18mg Comp 0,7mg	OR	Monitorizar presión sanguínea, sobretodo al inicio del tratamiento Ajustar en IR.
Ropinirol	Comp cub 1 mg Comp prolib 4 mg	OR OR	Contraindicado en IR severa e IH
Rasagilina MP2	Comp. 1 mg	OR	Medicamento peligroso MP2 Deben pasar >5 semanas entre el cese de un ISRS y el inicio de rasagilina, y >14 días entre el cese de rasagilina y el inicio de un ISRS

Selegilina	Comp 5 mg	OR	
------------	-----------	----	--

N05-PSICOLÉPTICOS

N05A-Antipsicóticos(Neurolépticos)

N05AA- Antipsicóticos: fenotiazinas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Clorpromazina	Gts 40mg/ml 10ml	OR	<i>Reducir la dosis en IH y ancianos</i> <i>Precaución en IR</i>
	Comp 25mg		
	Comp 100mg		
	Amp 5mg/ml 5ml	IM, PERF IV	
Levomepromazina	Gts 40mg/ml 10ml	OR	<i>Precaución en IR</i>
	Comp 25mg		
	Comp 100mg		
	Amp 25mg/ml 1ml	IM	

N05AD- Antipsicóticos: butirofenonas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Droperidol	2,5 mg/ml 1 ml	IV	<i>Ajuste en IR.</i>
Haloperidol	Gts 2mg/ml 15ml	OR	<i>Pocos efectos anticolinérgicos y</i> <i>cardiovasculares, por lo que es de elección</i> <i>en patología cardíaca.</i> <i>Ajustar dosis en IH</i>
	Comp 10mg	OR	
	Amp 5mg/ml 1ml	IM, IV LENTA	

N05AE- Antipsicóticos: indoles

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Ziprasidona MP3	Caps 20mg	OR	<i>Medicamento peligroso MP3</i>
	Caps 40mg		
	Caps 60mg		
	Caps 80 mg		
	Amp 20mg/ml 1 ml	IM	

N05AF- Antipsicóticos: tioxantenos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Zuclopentixol	Amp 50mg/ml 1ml	IM	<i>Alta potencia antipsicótica, efecto sedante</i> <i>intenso.</i> <i>No superar las dos semanas de tratamiento</i>
	Amp 200mg/ml 1ml	IM	

N05AH- Antipsicóticos: diazepinas, oxazepinas y tiazepinas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Clozapina	Comp 100mg	OR	<i>Esquizofrenia refractaria.</i> <i>Mínimos efectos extrapiramidales.</i> <i>Medicamento de especial control médico</i> <i>(riesgo de agranulocitosis y miocarditis)</i> <i>Precaución en IR</i>
Olanzapina	Comp 2,5mg	OR	<i>Utilizar dosis iniciales inferiores en IR e IH</i>
	Comp 5 mg		
	Comp 7,5 mg		
	Comp 10 mg		
	Comp 5 mg velotab		
	Comp 10mg velotab		
	Vial 5mg/ml 2ml	IM	
Quetiapina	Comp 25mg	OR	<i>Reducir dosis en IH</i>
	Comp 100mg		
	Comp 200mg		
	Comp 300mg		
	Comp 50mg liberación prolongada	OR	
	Comp 200mg liberación prolongada		
	Comp 300mg liberación prolongada		

N05AL- Antipsicóticos: benzamidas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Amisulprida	Comp 100 mg	OR	<i>Ajustar dosis en IR</i>
	Comp 400 mg		
Sulpiride	Cáps 50mg	OR	<i>A dosis bajas tiene acción ansiolítica y</i> <i>desinhibidora.</i> <i>Ajuste de dosis en IR</i>
	Amp 50mg/ml 2ml	IM	
Tiaprida	Comp 100mg	OR	<i>Reducir dosis en IR</i>
	Amp 50mg/ml 2ml	IM, IV	

N05AN- Antipsicóticos: litio

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Litio carbonato	Comp 400mg	OR	Disminuir dosis en IR

N05AX-Otros antipsicóticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Aripiprazol	Soluc 1 mg/ml 150 ml Comp 5 mg Comp 10 mg Comp 15 mg Vial 9,75 mg	OR IM	
Paliperidona MP2	Comp 3 mg Comp 6 mg	OR	Medicamento peligroso MP2 Es normal que en las heces aparezcan componentes insolubles del comprimido. Precaución en IR
Risperidona MP2	Sol 1mg/ml 30ml Comp 1mg Comp 3 mg Jer 25mg Jer 37,5mg Jer 50mg	OR IM	Medicamento peligroso MP2 Ajuste de dosis en IH e IR

N05B-Ansiolíticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Alprazolam	Comp 0,25mg Comp 0,5mg Comp 1 mg Comp 2 mg	OR	Psicotropo. Duración de acción corta. La retirada debe hacerse muy lentamente Ajuste en IR.
Bromazepam	Caps 1,5 mg Caps 3 mg	OR	Psicotropo. Duración de acción intermedia
Clorazepato dipotásico	Caps 5mg Caps 10mg Caps 15mg Comp 50mg Vial 10mg/ml 2ml Vial 20mg/ml 2,5 ml	OR IM,IV IM,IV	Psicotropo. Vida media larga Ajuste en IR.
Diazepam	Gtas 2mg/ml 15ml Comp 5mg Comp 10mg Amp 5mg/ml 2ml Enema 5mg	OR IM, IV Rectal	Psicotropo. Vida media larga. Reducir dosis en ancianos, hepatopatía y/o nefropatía Ajuste en IR.
Hidroxizina	Comp 25mg	OR	Ajuste en IR.
Lorazepam	Comp 1mg Comp 5mg	OR	Psicotropo. Duración de acción intermedia-corta, mínimo efecto miorelajante y rápido desarrollo de tolerancia Ajuste en IR.

N05C-Hipnóticos y sedantes

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Clometiazol	Caps 192 mg	OR	Reducir dosis en IH. Evitar uso prolongado y retirada brusca. No tratar >7 días (dependencia)
Dexmedetomidina	Amp 100 mcg/ ml 2 ml	PERF IV	Protocolo de uso en UCI Protocolo uso fuera de ficha en anestesia
Flurazepam	Caps 30mg	OR	Psicotropo. Ajuste en IR.
Lormetazepam	Comp 1 mg Comp 2 mg	OR	Psicotropo Ajuste en IR.

Midazolam	Comp 7,5 mg Amp 1 mg/ml 5 ml Amp 5mg/ml 3ml Amp 5 mg/ml 10 ml	OR IM,IV	Psicotropo. Medicamento de alto riesgo Ajuste en IR.
Zolpidem	Comp 10mg	OR	Psicotropo. Rápido inicio de acción y vida media corta. Disminuir dosis al 50% en ancianos. Precaución en IR. Reducir dosis en IH Alerta Agencia Española del Medicamento https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/NI-MUH_FV_05-2014-zolpidem.htm

N06-PSICOANALÉPTICOS

N06A-Antidepresivos

N06AA-Inhibidores no selectivos de la recaptación de monoaminas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Amitriptilina	Comp 10mg Comp 25mg Comp 50 mg	OR	En ancianos, 50% de la dosis inicial y aumentar muy lentamente. Evitar en patología cardíaca
Clomipramina (Clorimipramina)	Comp 25mg Comp 75mg	OR	En ancianos, 50% de la dosis inicial y aumentar muy lentamente Precaución en IR
Imipramina	Gg 25mg	OR	En ancianos, 50% de la dosis inicial y aumentar muy lentamente Precaución en IR
Maprotilina	Comp 75mg	OR	En ancianos, 50% de la dosis inicial y aumentar muy lentamente

N06AB- Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Citalopram	Comp 20 mg Comp 30 mg	OR	Alerta AEMPS: Dosis máx. recomendada en > 65 años: 20 mg/día
Escitalopram	Comp 10 mg Comp 15 mg Comp 20 mg	OR	Alerta AEMPS: Dosis máx. recomendada en >65 años: 10 mg/día
Fluoxetina	Caps 20mg Comp 10 mg	OR	Disminuir dosis en IR severa y en IH
Fluvoxamina	Comp 50 mg	OR	Disminuir dosis si alteración hepática severa. Monitorizar en IR. Esperar efecto terapéutico a las 2-4 semanas. Retirar gradualmente
Paroxetina MP3	Comp 20mg	OR	Medicamento peligroso MP3 Ajustar dosis en IR y en alteración hepática severa
Sertralina	Comp 50mg Comp 100 mg	OR	Disminuir dosis en IH

N06AX-Otros antidepresivos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Duloxetina	Comp 60 mg	OR	
Mianserina	Comp 10mg Comp 30mg	OR	Perfil similar a amitriptilina, pero con menos efectos anticolinérgicos y cardiotóxicos. Dentro de los heterocíclicos, es de elección en ancianos y patología cardíaca. Reducir dosis en IH
Mirtazapina	Comp 15mg Flas Comp 30mg Flas	OR	
Trazodona	Comp 100mg	OR	
Venlafaxina	Comp 37,5mg Comp 75mg retard Comp 150mg retard Comp 225 mg retard	OR	Disminuir dosis en ancianos. Evitar suspensión brusca Ajuste en IR.

N06BC- Xantinas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Cafeína citrato	Amp 20 mg/ml 1 ml	PERF IV, OR	Precaución en pacientes diabéticos (la cafeína puede elevar los niveles de glucosa en sangre). Ajustar dosis en IH

N06B- Otros Psicoestimulantes y nootrópicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Citicolina	Sobres 1 g Amp 250mg/ml 4ml	OR IV, IM	

N06D- Fármacos contra la demencia

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Donepezilo	Comp 5mg Comp 10mg	OR OR	
Memantina	Comp 10 mg	OR	Evitar la administración concomitante con otros antagonistas NMDA como amantadina, ketamina y dextrometorfano (riesgo de psicosis y aumento de efectos adversos) Ajuste en IR.
Rivastigmina	Cáp 1,5mg Cáp 3mg Parche 9,5 mg/24 h	OR TD	Precaución en IR
Galantamina	Caps 8 mg	OR	Precaución en IR grave

N07- OTROS FÁRMACOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO

N07AA-Parasimpaticomiméticos: anticolinesterásicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Neostigmina (bromuro)	Amp 0,5mg/ml 1ml	SC, IM, IV	
Piridostigmina (bromuro)	Comp 60mg	OR	

N07B-Fármacos usados en alteraciones adictivas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Carbimida	Gotas 60 mg/ml 15 ml	OR	Ampollas bebibles
Disulfirano	Comp 250 mg	OR	Ajustar dosis en IH e IR
Metadona	Comp 5 mg Comp. 30 mg Comp 40mg	OR	Medicamento de alto riesgo Precaución en IR
Nicotina	Parche 7mg/24h Parche 14mg/24h	TD TD	Uso restringido a S. Mental y UCI

N07XX- Otros fármacos que actúan sobre el sistema nervioso

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Dimetilfumarato	comp. gastror 50 mg	OR	Petición por paciente Precaución en IR
Fampridina	Comp 10 mg	OR	Medicamento con protocolo de uso Contraindicado en IR moderada-grave
Riluzol	Comp 50mg Susp oral 5 mg/ ml	OR	Precaución en IH e IR

- GRUPO P-PARASITOSIS

P01-ANTIPROTOZOARIOS

P01A-Amebicidas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Metronidazol	Comp 250mg	OR	

P01B-Antipalúdicos (Antimaláricos)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Atovacuona + Proguanil	Comp 100/250mg	OR	<i>Contraindicado en IR grave</i>
Cloroquina difosfato	Comp 155 mg	OR	<i>En terapia prolongada, hacer exploración oftalmológica y recuentos celulares periódicos. Precaución en pacientes con déficit de G6PDH Contraindicado en IR</i>
Hidroxicloroquina	Comp 200mg	OR	
Pirimetamina	Comp 25mg	OR	<i>En tratamientos prolongados administrar folinato cálcico Precaución en IR</i>

P02-ANTHELMINTICOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Albendazol	Comp 400mg	OR	<i>Monitorizar hemograma y función hepática</i>

P02D-ANTICESTODOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Sodio Cloruro	Sol 20 g/100 ml 500 ml vidrio	Intralesional	<i>No administrar vía intravenosa</i>

- GRUPO R-APARATO RESPIRATORIO

R03-MEDICAMENTOS CONTRA ALTERACIONES OBSTRUCTIVAS PULMONARES

R03AC-Antiasmáticos: adrenérgicos en inhalación

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Formoterol	Aerosol 9 mcg/puf (60 dosis)	INH	
Salbutamol	Aerosol 100mcg/puf (200 dosis) Amp nebul 2,5 mg/2,5 ml	INH INH	Precaución en hipertiroidismo, cardiopatía isquémica, HTA, ancianos y diabetes (en general para todos los β - agonistas selectivos)
Terbutalina (polvo inh)	Aerosol 500mcg/puf (200dosis)	INH	

R03AK -Antiasmáticos: adrenérgicos en combinación con glucocorticoides

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Formoterol + Budesonida (polvo inh)	Aerosol 9/320mcg/ puf (60 dosis)	INH INH INH	
Salmeterol + Fluticasona	Aerosol 25/125 mcg/puf (120 dosis) Aerosol 25/250 mcg/puf (120 dosis) Aerosol 50/250mcg /puf (60dosis) (polvo inhalado) Aerosol 50/500mcg/ puf (60dosis) (polvo inhalado)	INH INH INH	
Vilanterol + Fluticasona	Polvo inhalado 92/22 mcg (30 dosis) Polvo inhalado 184/22 mcg (30 dosis)	INH	Relvar Ellipta

R03AL-Antiasmáticos: adrenérgicos en combinación con anticolinérgicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Indacaterol + glicopirronio	Polvo inhalado 85/43 mcg (30 dosis)	INH	Ultibro Breezhaler Precaución en IR
Acidinio + formoterol	Polvo inhalado 340/ 12 mcg (60 dosis)	INH	

R03BA-Antiasmáticos: glucocorticoides

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Budesonida	Aerosol 200mcg/puf (120 dosis) Susp neb 0,25mg/ml 2ml	INH INH	Budesonida y beclometasona son equivalentes terapéuticos a dosis comparables
Budesonida polvo inhalado	Aerosol 200mcg/puf (100dosis)	INH	

R03BB-Antiasmáticos: anticolinérgicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Ipratropio, bromuro	Aerosol 20mcg/puf (300dosis) Sol resp amp 500 mcg/2ml	INH INH	
Tiotropio bromuro	Cáps 18mcg (dispositivo Handihaler)	INH	No utilizar en IR moderada- grave

R03C-Antiasmáticos: adrenérgicos uso sistémico

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Salbutamol	Amp 0,5mg/ml 1ml	SC, IM, PERF IV	
Efedrina	Amp 3 mg/ml 10 ml	IV	Precaución en IR

R03D-Otros para enfermedad obstructiva pulmonar, uso sistémico

R03DA-Antiasmáticos: xantinas

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Teofilina retard	Comp 100 mg Caps 200 mg	OR OR	Márgen terapéutico estrecho
Teofilina	Amp 20mg/ml 100ml	IV, PERF IV	

R03DC-Antiasmáticos: antagonistas de leucotrienos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Montelukast	Comp 10 mg	OR	Pacientes con protocolo de Alergia

R03DX-Otros agentes sistémicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Benralizumab	Pluma prec 30 mg	SC	Nevera Disponibilidad por paciente. Protocolo de uso en asma eosinoflica grave
Omalizumab	Jer prec 75 mg Jer prec 150 mg	SC	Nevera Disponibilidad por paciente. Protocolo de uso en urticaria
Mepolizumab	Pluma prec 100 mg	SC	Nevera Disponibilidad por paciente. Protocolo de uso en asma eosinoflica grave

R05-PREPARADOS PARA LA TOS Y EL RESFRIADO

R05C-Expectorantes y Mucolíticos

Existen mecanismos fisiológicos para eliminar la mucosidad bronquial: la tos y el transporte mucociliar. Una buena hidratación del enfermo facilita la fluidificación de la mucosidad y la acción de los mecanismos fisiológicos. El agua en forma de vahos produce un efecto demulcente y humectante, disminuyendo la viscosidad del esputo.

En general los expectorantes y mucolíticos no han demostrado eficacia por vía sistémica.

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Acetilcisteína	Sobres 100 mg Sobres 200mg Amp 100mg/ml 3ml	OR OR IM,IV, INH	No asociar con antitusígenos ni con anticolinérgicos
Ambroxol	Amp 7,5 mg/ ml 2 ml	OR IV , PERF IV, INH	Precaución en antecedentes de ulcus péptico Ajustar dosis en IR
Bromhexina	Gotas 2 mg/ ml 40 ml	OR, INH SC, IM, IV	Precaución en antecedentes de ulcus péptico
Carbocisteína	Sol 250 mg/ 5ml 240 ml	OR	Precaución en antecedentes de ulcus péptico
Mesna	Amp 200mg/ml 3ml	INH	Puede dar falsos positivos de cetonuria Contraindicado en IR

R05D-Antitusivos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Codeína	Comp 28,7 mg	OR	En tratamientos crónicos asociar laxante estimulante. Disminuir dosis en IR e IH
Dextrometorfano + Difenhidramina	Sol 3/1,5 mg/ml vaso 5 ml	OR	Evitar en IH

R06-ANTIISTAMÍNICOS USO SISTÉMICO

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Cetirizina	Comp 10mg	OR	Reducir dosis en IR e IH
Dexclorfeniramina	Jbe 0,4mg/ml 60ml Comp 2mg Comp 6mg Amp 5mg/ml 1ml	OR OR OR IV,IM	Puede ser necesario ajuste de dosis en IR e IH

R07-OTROS PREPARADOS PARA EL APARATO RESPIRATORIO

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Surfactante pulmonar porcino	Vial 120mg/1,5ml (80mg/ml)	Endotraque / Intrabronq	Nevera

- GRUPO S-ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

S01-OFTALMOLÓGICOS

S01A- Oftalmológicos antiinfecciosos

S01AA- Oftalmológicos antiinfecciosos: Antibióticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Gentamicina+ Metionina+ Retinol	Pda 3g	OFT	<i>Pomada oculos epitelizante. Contiene por 1g: 5mg Metionina+ 10000 UI Retinol+ 3mg Gentamicina</i>
Clortetraciclina	Col 0,5% 5ml Pda 0,5% 3g	OFT OFT	<i>Colircusí aureomicina. Oftalmolosa cusí aureomicina</i>
Tobramicina	Col 0,3% 5ml	OFT	<i>Tobrex</i>

S01AD- Oftalmológicos antiinfecciosos : Antivirales

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Aciclovir	Pda 3% 4,5g	TOP	<i>Zovirax oftálmico</i>

S01AX- Otros antiinfecciosos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Ciprofloxacino	Col 0,3% 5ml	OFT	<i>Oftacilox</i>

S01B-Oftalmológicos antiinflamatorios

S01BA- Oftalmológicos antiinflamatorios: Corticoesteroides, solos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Dexametasona	Implante 700 mcg	INTRAVIT	<i>Petición por paciente</i>
Prednisolona	Col 1% 5ml	OFT	<i>Pred forte</i>

S01BC-Oftalmológicos: Antiinflamatorios no esteroídicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Diclofenaco sódico	Col 0,1% 5ml	OFT	<i>Diclofenaco monodosis</i>

S01C-Combinaciones de antiinflamatorios y antiinfecciosos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Cloranfenicol + Dexametasona MP2	Col 7,3/ 1mg/ ml 10ml Pda 10/ 0,5mg/ g 3g	OFT OFT	<i>Medicamento peligroso MP2</i>
Gentamicina + Dexametasona + Tetrizolina	Col 3/ 1/ 0,5mg/ ml 10ml	OFT	<i>Colircusí GentaDexa</i>
Tobramicina + Dexametasona	Col 3/ 1mg/ ml 5ml	OFT	<i>Tobradex. Otras asociaciones de antibióticos y corticodes (Ej. Poly pred, Maxitrol) no están incluidas en Guía y se consideran equivalentes terapéuticos de TOBRAMICINA+DEXAMETASONA (Tobradex).</i>

S01E-Antiglaucoma y mióticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Acetazolamida	Comp 250 mg	OR	
Acetilcolina	Col 1% 5ml	OFT	<i>Acetilcolina 1% cusí</i>
Brimonidina	Col 0,2% 5ml	OFT	<i>Alphagan</i>
Brinzolamida	Col 1% 5ml	OFT	<i>Azopt</i>
Dorzolamida	Col 2% 5ml	OFT	<i>Trusopt</i>
Latanoprost	Col 0,005% 2,5ml	OFT	<i>Xalatan Nevera</i>
Pilocarpina	Col 2% 10ml	OFT	<i>Colircusí pilocarpina</i>
Timolol	Col 0,5% 3ml Col 0,25% 3ml	OFT OFT	<i>Timoftol 0,5% Timoftol 0.25%</i>

S01F- Midriáticos y ciclopéjicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Atropina	Col 0,5% 10ml Col 1% 10ml	OFT OFT	<i>Colircusí atropina</i>

Ciclopentolato	Col 1% 10ml	OFT	Colircusi ciclopléjico
Fenilefrina	Col 10% 10ml	OFT	Colircusi fenilefrina
Tropicamida	Col 1% 5ml	OFT	Colircusi tropicamida

S01H-Anestésicos locales

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Nefazolina+Tetracaina	Col 0,5/5 mg/ml 10 ml	OFT	Colircusi anestésico
Tetracaína + Oxibuprocaina	Col 1/ 4mg/ ml 10ml	OFT	Colircusi anestésico doble

S01J-Agentes para diagnóstico

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Fluoresceína	Col 2% 10ml Amp 10% 5ml	OFT IV	Colircusi fluoresceína Fluoresceína 10% oculos amp
Fluoresceína + Oxibuprocaina	Col 2,5/ 4mg/ ml 3ml	OFT	Colircusi fluotest Nevera

S01LA-Agentes antineovascularización

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VIA	OBSERVACIONES
Bevacizumab	Jeringa 5mg/0.2ml	INTRAVIT	Protocolo de uso fuera de FT, aprobado en CFyT (4/2013)

S01X-Otros oftalmológicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Carmelosa	Envase monodosis 2 mg / 0,4 ml (0.5%)	OFT	
Ciclosporina	Envase monodosis 0.05%, 0.5%, 1%,2%	OFT	FM
Hidroxiopropilmetil-celulosa	Gel oftálmico 0,5g	OFT	Gonioftal
Solución salina balanceada	Col 15 ml	OFT	Solución salina balanceada (BSS)
Sodio Cloruro	Pda 5% 5g	OFT	Oftalmolosa cusí antiedema

S02-OTOLÓGICOS

S02A- Otológicos: antiinfecciosos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Ciprofloxacino	Gts 0.3% 10ml	OTO	Baycip ótico

- GRUPO V-VARIOS

V01-ALÉRGICOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Extractos alérgicos	Viales	--	
Veneno de Apis Mellifera	Vial 5 ml	SC	Alutard sq Apis 100.000 squ/ml vial 5 ml Disponibilidad por paciente según Protocolo de uso aprobado en CFyT (4/2021)
Veneno de Apis Mellifera	Vial 5 ml	SC	Alutard sq Vespula 100.000 squ/ml vial 5 ml Disponibilidad por paciente según Protocolo de uso aprobado en CFyT (4/2021)

V03-TODOS LOS DEMÁS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS

V03AB-Antídotos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Acetilcisteína	Vial 200mg/ml (20%) 10ml	PERF IV	Hidonac antídoto 20%
Alcohol absoluto	Amp 99,9% 10ml	IV	Alcohol absoluto FM
Azul de metileno	Amp 1% 10ml	IV, PERF IV	No usar si IR
Carbón activado	Fco 50g	OR	Ver en grupo A07B
D- Penicilamina	Caps 250 mg	OR	Cupripen
Dantroleno	Vial 20mg/60ml	PERF IV	Ver en grupo M03
Dimercaprol	Amp 100 mg/ml 2 ml	IM	Precaución en HTA e IR. Alcalinizar la orina si la función renal está disminuida
Dimetilsulfoxido	Vial 10 ml	TOP	Dimetilsulfoxido Puro FM
Edetato cálcico disódico (EDTA)	Amp 50 mg/ml 10ml	PERF IV	Sodium calcium edetate
Fisostigmina	Amp 2 mg/ 5 ml	IM, IV	Anticholium
Flumazenilo	Amp 0,1mg/ml 5 ml Amp 0,1 mg/ ml 10 ml	IV IV	Flumazenilo
Glucagón	Hypokit 1mg sol.inyectable	IV, SC, IM	Glucagón hypokit
Idarucizumab	Vial 2,5 mg 50 ml	IV	Praxbind Petición por paciente con protocolo de uso Nevera
Ipecacuana jarabe	Fco. vidrio topacio 250ml	OR	Preparado oficial Composición por 100ml: -extracto fluido de ipecacuana.....7ml -ácido clorhídrico 0.1 N.....2.5ml -jarabe simple.....c.s.p 100ml
Naloxona	Amp 0,4mg/ml 1ml	IV, IM, SC	Naloxone
Peptina + fosfato sódico + sales de magnesio			Eupeptina. Ver en grupo AD6AD
Pralidoxima	Vial 20 mg/ml 10 ml	IV, PERF IV	Contrathion Precaución en IR, miastenia gravis y ancianos. No utilizar morfina ni teofilina
Protamina	Vial 10mg/ml 5ml	IV	Si se utiliza en exceso tiene efecto anticoagulante
Silibilina	Vial 350mg	IV	Legalon Sinónimo: silimarina
Suero antiviperino	Vial 4ml	PERF IV	Vipertab
Sugammadex	Vial 100 mg/ml 2 ml	IV IV	Bridion
Tiosulfato sódico	Amp 1/6 M	SC	Tiosulfato sódico 1/6 M FM
Vitamina K (Fitomenadiona)	Amp 2 mg 0,2ml Amp 10mg/ml 1ml	IV, IM, OR	Ver en grupo B02BA

V03AC-Agentes quelantes del hierro

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Deferoxamina	Vial 500mg	IV,IM,SC, PERF IV	Monitorizar ECG y fondo de ojo en tratamientos prolongados

V03AE-Fármacos antihiperpotasémicos y antihiperfosfatémicos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Calcio, acetato	Cap 500 mg	OR	<i>Puede disminuir la absorción de tiroxina, quinolonas y tetraciclina</i>
Carbonato de lantano	Comp mast 500 mg Comp mast 750 mg	OR	
Poliestirensulfonato cálcico	Bote 400g	OR,REC	

V03AF-Desintoxicantes de citostáticos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Folinato cálcico	Comp 15mg Amp 50 mg Amp 300 mg	OR PERF IV PERF IV	<i>Nevera</i>
Hialuronidasa	Amp 1500 UI/ml	IM o SC	<i>Sinónimos:mucopolisacaridasa, condroitinasa, condroitinsulfatasa. No administrar IV, sólo IM o SC. Medicamento extranjero. Nevera</i>
Mesna	Amp 100mg/ml 2ml	IV	<i>Las ampollas se pueden administrar VO, disueltas en comida, zumos o leche</i>
Rasburicasa	Vial 1.5 mg	IV	<i>Nevera</i>

V04-AGENTES PARA EL DIAGNÓSTICO

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Gonadorelina	Amp 0,1 mg/1 ml	IV	<i>L.H.R.H Ferring Medicamento extranjero Nevera</i>
Metacolina	Vial 100 mg vial	INH	
Tirotropina alfa (TSH humana recombinante)	Vial 0,9mg	IM	<i>Thyrogen Nevera</i>
Tuberculina	Vial 20 UT/ml (multidosis)	Intradérmic	<i>Nevera</i>
Urea 13 C	Comp 100mg	OR	

PREPARADOS PARA NUTRICIÓN ENTERAL

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Dietas completas			
Normocalórica normoproteica polimérica	Fco 500ml Flexibag	ENT ENT	
Normocalórica normoproteica polimérica con fibra	Fco 500 ml	ENT	
Hiperclórica hiperproteica polimérica	Pack 500ml	ENT	
Hiperclórica hiperproteica polimérica con fibra	Pack 500ml		
Hiperclórica normoproteica polimérica	Fco 500ml	ENT	
Hiperclórica normoproteica polimérica con fibra			
Normocalórica hiperproteica polimérica inmunomoduladora	Fco 500ml	ENT	
Oligomérica , normocalórica normoproteica	Bolsa 500ml	ENT	
Normocalórica normoproteica especial para diabéticos	Fco 500ml Botella 500 ml	ENT	
Normocalórica hiperproteica especial para diabéticos	Fco 500ml	ENT	
Normocalórica normoproteica especial para pacientes con diarrea o disfunción de la mucosa intestinal y colónica. (Fibra soluble 100%)	Fco 500ml	ENT	
Hiperclórica y normoproteica (pacientes con enfermedad pulmonar)	Botella 500 ml	ENT	

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Hipercalórica e Hipoproteica. Especial para pacientes con <u>insuficiencia renal pre-diálisis</u>	Botella 220 ml	ENT	
Oligomérica, hiperproteica. Especial para hepatopatía crónica (encefalopatía hepática)	Sobres 100g	OR y ENT	
Dieta hipocalórica	Brik vainilla, choco	OR	

Suplementos

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Suplemento <u>hipercalórico</u> (1,5 Kcal/ml)normoproteico	Botella 200ml vainilla, chocolate	OR	
Suplemento <u>hipercalórica</u> 1,3 kcal/ml <u>hiperproteica</u>	Botella 200 ml vainilla	OR	
Suplemento <u>hipercalórica</u> 1,28 kcal/ml <u>hiperproteica</u> con fibra	Botella 220ml multisabor		
Suplemento <u>hipercalórico</u> 1.5 kcal/ml <u>hiperproteica</u>	Botella 200 ml sabor vainilla, chocolate	OR	
Suplemento <u>hipercalórico</u> 2 kcal/ml <u>hiperproteico</u> con fibra	Pack multisabor		
Suplemento <u>normocalórico</u> <u>hiperproteico</u> para pacientes diabéticos	Botella 200ml multisabor	OR	
Suplemento <u>oligomérico</u> para pacientes con funciones gastrointestinales alteradas	Copa 200 ml sabor vainilla	OR/SONDA	

Módulos

Módulo de proteína	Sobre 10g	OR	
Módulo de L-arginina	Sobre 7g (5g de L-Arginina)	OR	

Otros

Espesante instantáneo para alimentos líquidos o semisólidos en frío o en caliente	Sobre 6,4 g	ENT	
---	-------------	-----	--

V07-TODOS LOS DEMÁS PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Agua para inyección	Amp 10ml Amp 20 ml	IV IV	
Sodio, Cloruro	Amp 0,9% 10 ml	IV	

V08-MEDIOS DE CONTRASTE. (Medicamentos de alto riesgo: Contrates IV)

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Amidotriazoato de meglumina + Amidotriazoato de sodio	Fco 100ml Vial 607,5 / 82,5mg/ml 20ml	OR, REC IV, Intraarterial	<i>Gastrografin</i> <i>Urografin 76%</i> Contiene por ml: Amidotriazoato de meglumina: 660mg + Amidotriazoato de sodio 100mg
Bario sulfato	Polvo 98% 340g Polvo 97,4% 570g Susp 5 g/100 ml 150 ml	OR REC OR	<i>Barigraf A.D., Barilux A.D.</i> <i>Barigraf enema</i> <i>Sulfato de bario</i>
Gadobutrol	Vial 604,72 mg/ml 15 ml	IV	<i>Gadovist</i>
Gadoxetato disódico	Jer prec 1814 mg/ 10ml	IV	<i>Primovist</i> Medicamento con protocolo de uso
Hexafluorano de azufre	Fco 8mcl/ml 5 ml	IV	<i>Sonovue</i>
Iohexol(Disponibilidad según acuerdo marco)	Frasco 240 mg/ml 50ml Frasco 300mg/ml 50 ml Frasco 300 mg/ml 100ml Frasco 300 mg/ml 500 ml Frasco 350mg/ml 50 Frasco 350 mg/ml 100 ml	IV Intraarterial	<i>Omnipaque</i>
Iopamidol	Fco 0,755 g/ ml 50ml	IV, Intraarterial	<i>Iopamiro 370</i>

NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	VÍA	OBSERVACIONES
Iopromida (Disponibilidad según acuerdo marco)	Frasco 300 mg/ml 100ml Frasco 300mg/ml 500ml	IV, Intrararterial	<i>Ultravist</i>
Ioxaglato de sodio + Ioxaglato de meglumina	Frasco 0,20 g + 0,39 g/ ml 20 ml	Intravascular	<i>Hexabrix 320</i>

ABREVIATURAS

Amp	Ampolla	MCT	Triglicérido de cadena media
Ca ²⁺	Calcio	mEq	miliequivalente
Cal	Calorías	mg	Miligramo
Caps	Cápsula	Mg ²⁺	Magnesio
Cl	Cloro	ml	mililitro
cm	Centímetro	mM	milimoles
CO ₃ H-	Bicarbonato	Mn	Manganeso
Col	Colirio	Mo	Molibdeno
Comp	Comprimidos	mOsm	miliosmoles
Comp mast	Comprimido masticable	multicomp.	multicompartmental
Comp recub	Comprimido recubierto	N	Nitrógeno
CONG	Conservar congelado	Na	Sodio
Cr	Cromo	OFT	Oftálmica
Cu	Cobre	OR	Oral
Disp vag	Dispositivo vaginal	Osm	Osmolaridad
EFG	Especialidad farmacéutica genérica	P	Psicótropo
ENT	enteral	Pda	Pomada
F	Flúor	PERF IV	Perfusión intravenosas
Fco	Frasco	Plast	plástico
Fe ²⁺	Hierro divalente	prec	precargada
FM	Fórmula magistral	puff	pulsación
g	Gramo	PVC	Cloruro de polivinilo (con DEHP ó DOP)
GFT	Guía Farmacoterapéutica	REC	Rectal
Gg	Gragea	SC	Subcutánea
Glu	Glucosa	Se	Selenio
Gts	Gotas	SL	Sublingual
I	Iodo	SNG	Sonda nasogástrica
IM	Intramuscular	Sol	Solución
INH	Inhalación	Sup	Supositorio
INTRAART	Intraarticular	Susp	Suspensión
IV	Intravenosa	TD	Transdermica
Jbe	Jarabe	Top	Tópica
Jer	Jeringa	Transm	Transmucosa
Jer autoiny	Jeringa autoinyectable	U	Unidades
K+	potasio	UI	Unidades internacionales
Kcal	kilocalorías	UT	Unidades de tuberculina
Lac-	Lactato	vag	vaginal
LCT	Triglicérido de cadena larga	Zn	Zinc
M	Molar	IR	Insuficiencia renal
mcg	microgramo	IH	Insuficiencia hepática
mcmol	micromoles	HT	Hipertensión