




**Febrero 2022**

## **NO HACER...**

### **La Sociedad Española de Urología RECOMIENDA:**

1. No realizar TAC de estadiaje ni Gammagrafía ósea en pacientes con cáncer de próstata clínicamente localizado si el PSA es menor de 10 y el Gleason es menor de 8.
2. No tratar la vejiga hiperactiva sin excluir otras patologías que puedan causar sintomatología similar.
3. No restringir la ingesta de calcio en los pacientes con litiasis renal cálcica recidivante si su dieta se considera adecuada.
4. En pacientes asintomáticos y con PSA inferiores a la normalidad, no realizar determinaciones de PSA en intervalos inferiores a 1 año.
5. No realizar estudios de fertilidad, tanto en la mujer como en el varón, sin disponer de al menos dos seminogramas que no cumplan parámetros de normalidad

 [https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/cal\\_sccc.htm](https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/cal_sccc.htm)

 [https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/0\\_ASOCIACION\\_ES\\_P\\_UROLOGIA\\_OK.pdf](https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/0_ASOCIACION_ES_P_UROLOGIA_OK.pdf)